MAPA CONSEPTUAL

Nombre del Alumno: Catarina Jiménez López

Nombre del tema: Fracturas Y Luxaciones

Parcial: I

Nombre de la Materia: Enfermería del Adulto

Nombre del profesor: Marcos Jhodanny Arguello

Nombre de la Licenciatura: Lic. En Enfermería

Cuatrimestre: Sexto Cuatrimestre C

FRACTURAS Y LUXACIONES

FRACTURAS

Se producen por acciones de traumas externas o por violentas con traciones musculares.

Tres causas:

directa: punto del ajente traumatico, transversal.

indirecta: punto distante de donde se aplica la fuerza vulnerante.

muscular: contraccion muscular energica.

Clasificacion:

Cerrada, abierta, incompletas, incurvacion traumatica, inflexion, impactacion, fisura, aplastamiento travecular .

cmpletas: transversal oblicua, espiroidea entre otros.

AO

La AO a hecho sus clasificacion en relacion a loa segmentos oseos dividiendo en 3 tipos, A,B Y C.

Cada unode estos tres grupos tienen supgrupos.

Si el segmento es diafisario

tipo A: fractura simple

tipo B: fractura con fracmento

tipo C: fractura cnminuta.

Si el fragmento es metafisoepifisario.

tipo A; fractura extraarticular

tipoB:fractura intraarticular.

tipo C:combinacion de las 2 anteriores.

TRATAMIENTO

Es importante el valor de la radiografia en el control de la evolucion del tratamiento de la fractura.

Tratamiento es base de antalgicos, antiim-flamatorios relajantes, sedantes y antibioticos

Tratamiento indifinitivos:

reduccion

inmovilizacion

tratamiento funcional.

LUXACIONES

Perdida permanente del contacto habitual de dos superficies articulares.

Si la perdida es total se le llama luxion completa .

Si es percial se le llama subluxacion.

ETIOLOGIA Y ANATOMIA PATOLOGICA

Se necesita un trauma intenso, se da mas en adulto y en hombres.

Mecanismo directo , indirecto o por violentos contracciones musculares.

Anatomia patologica: se observa rubtura capisular aveces desgarros de lagamentos, musculos particulares, vasos, nervios y piel.

Si el fragmento es metafisoepifisario.

tipo A; fractura extraarticular

tipoB:fractura intraarticular.

tipo C:combinacion de las 2 anteriores.

TIPOS Y CARACTERISTICAS

Traumaticas: Trauma intenso, recidivante,.

habitual luxiones que el mismo paciente lo produce.

antigua, cuando pasan mas de 3 semanas.

Ortopedica:

congenita, alteracion congenita fuperficie articular.

patologica;destruccion de una o de 2 superficie.

Se caracteriza por: dolor,deformidad, posicion del miembro y fijacion elastica.