



**Mi Universidad**

*Nombre del Alumno JENNIFER LOPEZ VELAZQUEZ*

*Nombre del tema FRACTURAS Y LUXACIONES*

*2 Parcial*

*Nombre de la Materia ENFERMERIA DEL ADULTO*

*Nombre del profesor MARCOS JHODANY ARGUELLO GALVEZ*

*LICENCIATURA EN ENFERMERIA*

*6 Cuatrimestre*

# FRACTURAS Y LUXACIONES

## FRACTURA

Una fractura es un hueso roto. Las fracturas generalmente son causadas por lesiones. Como a veces pueden ser serias, es importante que obtenga atención médica inmediata si cree que tiene una fractura.

### CAUSA

En general, las fracturas suceden a causa de accidentes de auto, caídas y lesiones deportivas. El uso excesivo y movimientos repetitivos también pueden causar fracturas. Densidad ósea baja y osteoporosis son afecciones que causan debilidad de sus huesos. Tener estas afecciones lo hace más propenso a romperse un hueso.

### TIPOS

- Si el hueso está parcial o completamente roto
- Si el hueso atraviesa la piel; si lo hace, se le llama fractura abierta (o compuesta). Si no, es una fractura cerrada
- La dirección o forma de la fractura, por ejemplo, si está en una línea a lo largo del hueso o si tiene algún tipo de patrón
- La causa de la fractura, por ejemplo, una fractura por estrés es una rotura pequeña que frecuentemente es causada por exceso de uso
- El hueso que está roto, por ejemplo, fracturas faciales incluyen nariz y mandíbula

## LUXACIONES

Es una separación de dos extremos de los huesos en el lugar donde se encuentran en una articulación. Una articulación es el lugar en donde dos huesos se conectan, lo que permite el movimiento. Una articulación luxada es una articulación donde los huesos ya no están en su posición normal.

### CAUSAS

Las luxaciones generalmente son causadas por un impacto súbito a la articulación. Esto por lo general se presenta después de un golpe, una caída u otro traumatismo.

### SIGNOS

Una articulación luxada puede:

- Estar acompañada de entumecimiento u hormigueo en la articulación o fuera de esta
- Presentar dolor intenso, especialmente si usted intenta usar la articulación o poner peso en ella
- Estar limitada en el movimiento
- Estar hinchada o amoratada
- Estar visiblemente fuera de lugar, de color diferente o deforme

La subluxación de la cabeza del radio (codo de niñera) es una luxación parcial común en los niños que empiezan a caminar. El síntoma principal es la renuencia del niño a utilizar el brazo. Esta subluxación se puede tratar fácilmente en el consultorio médico.