



NUTRICION CLÍNICA

Profesor: Julibet Martínez Guillén

Alumna: Ana Gabriela
López Gómez

Especialidad: Lic. Enfermería

Grado y Grupo: 3"A"

Actividad "2".

4.4 NUTRICIÓN ENTERAL Y PARENTERAL

NUTRICIÓN ENTERAL

NUTRICIÓN PARENTERAL

¿QUE ES?

La alimentación enteral es una técnica de nutrición que representa una opción para alimentar al paciente que no quiere comer por razones patológicas o psicológicas, que no puede comer cantidad suficiente para cubrir sus necesidades nutrimentales.

LOS SITIOS DE ENTRADA DE LA SONDA PUEDE SER LOS SIGUIENTES.

- Nasogástrica.
- Nasoyeyunal.
- Gastronomía.
- Yeyunostomía.

LA ALIMENTACIÓN PUEDE SER:

COMPLETA: Cuando el total de nutrimentos se cubre por vía enteral

INDICACIONES

- Por deglución alterada debida a trastornos del sistema nervioso central.
- Por trastornos psiquiátricos como depresión, ansiedad, demencia.
- Por hipercatabolismo.
- Por trastornos digestivos.
- Alimentación postquirúrgica temprana.
- Por desnutrición.

- Homogénea
- De baja viscosidad
- De osmolaridad controlada (cerca a los 300 mOsm/L).
- Con densidad energética entre 0.8 a 2.0 kcal/ML o que cubra los requerimientos nutrición del sujeto (según la patología)
- De fácil administración. Adecuada al periodo que se va a utilizar, con seguridad bacteriológica
- De costo accesible a las condiciones socioeconómicas del paciente y su familia.

¿QUE ES?

La alimentación parenteral es otra opción para nutrir al paciente que no puede utilizar el sistema digestivo y necesita recibir los nutrientes a través de una vena central o periférica.

ADMINISTRACIÓN

- Administrada a través de un acceso venoso central.
- permite la administración de volúmenes y concentraciones simultáneo de un sustrato calórico, proteico y lipídico. Al cual se añaden vit, electrolitos y elementos traza.

INDICACIONES

- Cuando el uso del tracto GI está contra indicado.
- Vómito profuso incontrolable.
- Enfermedad inflamatoria intestinal severa.
- Fístula enterocutánea de alto gasto.
- Pancreatitis severa necrotizante.
- Sepsis intraabdominal severa.
- Sd. Intestino Corto.
- Enteritis por radiación.
- Fístula recto vaginal

ALIMENTACIÓN PARENTERAL

COMPLETA: Cuando el total de nutrimentos se cubre por vía enteral.

BIBLIOGRAFIA

[bc13027da19a70cbf88579a774365a05-LC-LEN304 NUTRICIÓN CLÍNICA.](#)