

Mi Universidad

Mapa conceptual

NOMBRE DEL ALUMNO: Liliana Tomas Morales

TEMA: CUIDADOS A PACIENTES CON ALTERACIONES DE LA PIEL, Y ALTERACIONES DIGESTIVAS.

PARCIAL: I

MATERIA: enfermería médico quirúrgica II


NOMBRE DEL PROFESOR: Lic. Rubén Eduardo Domínguez García.

LICENCIATURA: Enfermería

CUATRIMESTRE: 6

ANATOMIA Y FISIOLOGIA DE LA PIEL

Mi Universidad



ENFERMEDADES PAPULOESCAMOSAS

Son Mi Universidad

Más frecuentes (psoriasis, tiña, pitiriasis rosada y liquen plano) son trastornos cutáneos primarios.

PSORIASIS

En

Una enfermedad crónica, inflamatoria y proliferativa

Algunas son

La lesión más típica es una placa eritematosa de bordes netos.

Cubierta por

Escamas gruesas, blanquecinas, de aspecto céreo, no adherentes.

Etiología

Causa desconocida, puede ser que sobre cierta predisposición genética actúen.

La base genética de la psoriasis se apoya en la acumulación de casos familiares.

Clínica

Psoriasis Vulgar:

Son

Placas eritemato escamosas, bien delimitadas, pueden estar rodeadas de un halo claro.

Psoriasis gutatta:

Es

Casi exclusivo de niños y adultos jóvenes.

Son

Lesiones de pequeño tamaño que aparecen de modo explosivo.

Psoriasis invertida:

Afección de grandes pliegues por lesiones de psoriasis.

Psoriasis de uñas

Puede ser

La única manifestación de psoriasis, y aparecer en alguna o todas las uñas.

Psoriasis de cuero cabelludo

El pelo atraviesa la placa y no produce alopecia.

Psoriasis palmo-plantar

Se localiza en eminencia tenar, hipotenar o área central de palmas.

Es más

Frecuente en mujeres postmenopausicas.

Psoriasis de uñas

La mucosa genital masculina puede afectarse en una psoriasis en placas que tendrán poco o ningún componente descamativo.

DERMATITIS SEBORREICA

Causa desconocida, crónico, que cursa con brotes, que afecta a lactantes y adultos la piel del cuero cabelludo

Es

Como placas eritemato escamosas, con descamación blanquecino-amarillenta.

Histología

No diagnóstica. Puede haber paraqueratosis perifolicular.

TUMORES DE LA PIEL

Es

La neoplasia maligna más común a nivel mundial y su incidencia ha ido al alza en las últimas décadas.

Se divide en:

Melanoma y no melanoma

CÁNCER DE PIEL NO MELANOMA

Son

Tumores malignos más comunes a nivel mundial

CARCINOMA BASOCELULAR

Es el

Cáncer de piel más común

Se trata de:

De una neoplasia con bajo potencial metastásico y crecimiento lento, pero localmente invasiva y destructiva.

La sudoración y humedad de la zona impiden la formación de escamas.

ANATOMIA Y FISIOLOGIA DEL SISTEMA DIGESTIVO

Constituido por **Mi Universidad**

Un tubo hueco abierto por sus extremos (boca y ano)

Incluye:

ALTERACIONES DE LA CAVIDAD ORAL



ALTRACIONES DEL ESOFAGO

Mi Universidad

Etiología es en ocasiones desconocida, aunque parece estar implicada la existencia de reflujo gastroesofágico.

ALTERACIONES GASTRICAS

Son

Trastornos motores que impactan la calidad de vida de los pacientes y pueden afectar cualquier segmento del aparato digestivo.

DIVERTÍCULOS ESOFÁGICOS

Son

Dilataciones circunscritas de la pared esofágica, normalmente únicas, tapizadas por mucosa y tejido conjuntivo.

La complicación más frecuente es la neumonía por aspiración.

HERNIA HIATAL

Supone

Presencia de una proporción variable del estómago a nivel intratorácico.

Se ha

Deslizado a la cavidad torácica a través del hiato diafragmático.

El diagnóstico endoscópico se establece al localizar la línea Z.

ROTURA ESOFÁGICA

Causas

Más comunes de rotura esofágica son los procedimientos médicos.

La ruptura espontánea o síndrome de Boerhaave

Es una

Entidad excepcional y muy grave, más frecuente en alcohólicos

Se diagnostica

Con esfigmograma con contraste hidrosoluble que se introduce en pequeños bolos

Para

Visualizar localización y extensión de la perforación.

A menudo aparece esofagitis por candida

ESPASMO ESOFÁGICO DIFUSO

Es el

Segundo trastorno motor más frecuente.

Se caracteriza

La presencia de ondas peristálticas simultáneas asociadas a ondas de características normales

Cursa

Dolor torácico y a menudo con disfagia que se desencadena por estrés

ESCLERODERMIA

Es una

Enfermedad autoinmune existe afectación esofágica

Se manifiesta

Como pirosis, regurgitación ácida

Las complicaciones más habituales son la estenosis y el desarrollo de un esófago de Barret.

REFLUJO GASTROESOFÁGICO

Parece ser que el factor principal se concreta en la incompetencia del esfínter inferior del esófago

El

Contenido gástrico puede conducir a la génesis de la patología del reflujo

ULCERA PÉPTICA

Interviene decisivamente la infección por Helicobacter pylori

Se caracteriza

Reacción inflamatoria que cambia su arquitectura, desintegración del moco por acción de proteasas específicas.

DISPEPSIA FUNCIONAL Y SÍNDROME DEL INTESTINO IRRITABLE:

Son

Aquellos procesos de malestar abdominal, con sintomatología muy diversa e imprecisa de origen funcional.

Cursan

Dolor abdominal anodino, acompañado de otros síntomas

ALTERACIONES INTESTINALES

ESTREÑIMIENTO

Consiste en

La dificultad en evacuar las heces.

Es un proceso

Que sólo se considera pernicioso si se prolonga durante más de tres días consecutivos.

Esto se debe a:

- dieta inadecuada con poca cantidad de fibra,
- escasa ingesta de líquidos,
- sedentarismo,
- abuso de laxantes,
- embarazo, edad avanzada

Recomendaciones:

- Realizar ejercicio físico de forma moderada.
- Ingerir alimentos ricos en fibra: pan integral, verduras y frutas.
- Beber muchos líquidos, sobre todo agua.
- Comer despacio y masticar bien.

La glándula pancreática puede sufrir un proceso inflamatorio que se manifiesta de forma.

PANCREATITIS AGUDA

Es una

Patología relativamente común que se define como una inflamación aguda del páncreas.

Puede afectar

Tejidos circundantes y órganos a distancia.

Se produce como

Consecuencia de una liberación in situ de las enzimas pancreáticas en su forma activa dando lugar a la auto digestión.

En los casos más severos, las proteasas activadas actúan en todo el organismo, produciendo alteraciones hemodinámicas,

PANCREATITIS CRÓNICA

Es una

Inflamación permanente de la glándula pancreática que se traduce en un deterioro progresivo e irreversible

Puede afectar

Más a varones entre la tercera y la cuarta década de la vida

Principal factor

El alcohol podría actuar como un tóxico celular capaz de producir una acumulación de gotas de grasa

En el

Interior de las células acinares y de activar las enzimas intracelulares

Personas presentan en un momento u otro de su vida problemas intestinales, como la diarrea y el estreñimiento

Pueden ser

Síntomas de enfermedades graves, como es el caso de la diarrea cuando está asociada al cáncer de colon.

DIARREA

Se caracteriza

Por la presencia de heces acuosas, poco compactas y frecuentes.

Causa

Es una infección viral leve que se resuelve de forma espontánea en pocos días.

Enfermedades asociadas

Enfermedad intestinal inflamatoria

Síndromes de malabsorción

Síndrome del intestino irritable

Inmunodeficiencia