



**Mi Universidad**

## **CUADRO SINÓPTICO**

**NOMBRE DEL ALUMNO:** KEIT SELENI AGUILAR DÍAZ

**TEMA:** UNIDAD II. LAS TEORÍAS PSICOANALÍTICAS

**PARCIAL:** Primero.

**MATERIA:** PSICOMETRÍA

**NOMBRE DEL PROFESOR:** Lic. Asli Belén Calderón Roblero

**LICENCIATURA:** Psicología.

**CUATRIMESTRE:** Primero.



El test clínico de Bender consiste, en pedirle al sujeto que copie a figuras dadas y en analizar y evaluar a través de las reproducciones así obtenidas cómo ha estructurado el sujeto esos estímulos perceptuales.

Bender define la función gúestáltica "cómo aquella función del organismo integrado por la cuál este responde a una constelación de estímulos dada cómo un todo, siendo la respuesta misma una constelación, un patrón una Gestalt.

Se entregan al niño dos hojas de papel tamaño carta, un lápiz número 2 y una goma de borrar. Después de establecer un buen reporte muéstrale las tarjetas de Bender, luego que el niño ha acomodado la posición del papel la primera tarjeta, la figura a frente al niño, cuando el niño ha terminado de dibujar una figura se retira una tarjeta y se pone la siguiente, se anota las observaciones del niño durante el test hay que registrar el tiempo empleado ya que si es corto O largo tiene valor diagnóstico. no se debe alentar ni impedir el uso de La goma de borrar o realizar varios intentos. se permite usar todo el papel que desee. si empieza a contar los puntos se le puede decir "no necesitas contar los puntos simplemente trata de hacerlo más parecido."

\*cuestionarios cerrados.  
\*entrevistas.  
\*test de CI  
\*test para detección de TDAH.

### CALIFICACIÓN

El puntaje se obtiene como es de práctica, sumado los puntajes parciales, esto es los valores de los fallos cometidos en las 8 reproducciones y en la "configuración".

Normalmente más alto puntaje, peor diagnóstico, la tabla de significados diagnósticos de las normas es lo siguiente:  
80- límite entre "paciente" no "paciente".  
72 o más necesitan atención psiquiatra.  
72-50 dudoso.  
49 o menos no necesitan atención psiquiatra.

Los test neurológicos juegan un papel muy importante como instrumento de medida, para la capacidad cognitiva se encuentra en una serie de variables:

La edad, nivel socioeconómico, grado de alfabetización, etnia, estado de ánimo, otros elementos que pueden dificultar una correcta valoración neuropsicológica.

Interpretación y redacción de informe

La mayoría necesitan aprox. 6 minutos a 20 seg., mientras que los niños con problemas de aprendizaje y de comportamiento tienden a trabajar más rápido (5 min.19seg) los hiperactivos (4 min 41 seg )

El informe del test de Bender debe contener:

- 1.- datos generales.
- 2.- motivo de consulta.
- 3.- observación de la conducta.
- 4.- prueba aplicada.
- 5.- resultados.
- 6.- interpretación de los resultados.

-test Barcelona revisado-

-test de retención visual de Benton.

-Bender, test gúestaltico visomotor.

-test de colores y palabras