



Mi Universidad

Cuadro Sinóptico

Nombre del Alumno: Juárez Marroquín Aneydi Ricarda

Nombre del tema: Trastorno bipolar y relacionados y Trastornos depresivos.

Parcial: Segundo.

Nombre de la Materia: Psicopatología I.

Nombre del profesor: Mtra. María del Carmen Briones Martínez.

Nombre de la Licenciatura: Psicología.

Cuatrimestre: Sexto.

T
r
a
s
t
o
r
n
o

b
i
p
o
l
a
r

Que es: Se caracteriza por oscilaciones del estado de ánimo debido a una alteración en los Mecanismos biológicos que lo regulan.

tipos

- tipo 1
- tipo II
- Ciclotimia tipo III

Episodio maníaco

Es un período bien definido de estado de ánimo anormal y persistentemente elevado, expansivo o irritable, y un aumento anormal o persistente de la actividad o la energía que está presente la mayor parte del día.

Características del Episodio maniático

anormal y persistentemente elevado, expansivo o irritable, y un aumento anormal o persistente de la actividad o la energía que está presente la mayor parte del día, casi cada día, durante un período de al menos 1 semana

Síntomas episodio maniático

- 1.- Aumento de la actividad
- 2.- Euforia
- 3.-Irritabilidad
- 4.-Grandiosidad
- 5.- disminución de la necesidad de dormir.
- 4.- aumento de la sociabilidad.

. Episodio maníaco, hipomaniaco y depresivo
Episodio maníaco

Síntomas episodio hipo maniático:

- Periodo de humor elevado, expansivo e irritable que dura por lo menos 4 días.
- Manía sin alterar el funcionamiento social u ocupacional.
- Aumento de energía e impulsos.

Episodio hipomaniaco
Criterios diagnósticos

1. Aumento de la autoestima o sentimiento de grandeza
- 2.- Disminución de la necesidad de dormir
- 3.- . Más hablador de lo habitual o presión para mantener la conversación.
- 4.- Fuga de ideas o experiencia subjetiva de que los pensamientos van a gran Velocidad.
- 5.- Facilidad de distracción
- 6.- Aumento de la actividad dirigida a un objetivo.
- 7.- Participación excesiva en actividades que tienen muchas posibilidades de consecuencias dolorosas.

Síntomas episodio

Depresivo:

1. estado de ánimo depresivo
2. Alteraciones del sueño
3. Variaciones en el peso
4. Fatiga, falta de energía
5. Baja autoestima
6. Falta de concentración
7. Pensamientos de muerte
8. Síntomas psicóticos

Trastorno bipolar II

- Características

- 1.-episodios de depresión mayor un episodio hipomaniaco
- 2.-El episodio depresivo mayor debe durar al menos 2 semanas episodio hipomaniaco debe durar al menos 4 días

Los episodios de trastorno

- 1.-Depresivo inducido por sustancias/medicamentos, de trastorno bipolar y trastornos relacionados.
- 2.-trastorno depresivo y trastornos relacionados debidos a otra afección Medica.
- 3.- No están superpuestos al diagnóstico de esquizofrenia
- 4.- Los episodios depresivos o las fluctuaciones hipomaniacas.

Los pacientes con trastorno bipolar II

Los episodios hipomaniacos

Como patológicos o desfavorables, aunque el comportamiento errático del individuo pueda molestar a otras personas.

Episodio de depresión mayor

- 1.-estado de ánimo deprimido
- 2.- pérdida de interés o de placer.
- 3.- Disminución importante del interés o el placer
- 4.- Pérdida importante de peso sin hacer dieta o aumento de peso.

Los síntomas

Causan malestar clínicamente significativo o deterioro en lo social, laboral u otras áreas importantes del funcionamiento.

Trastorno ciclotímico

Es una alteración crónica y fluctuante del estado de ánimo que conlleva numerosos períodos de síntomas hipomaníacos y períodos de síntomas depresivos que son distintos entre sí.

Hipomanía { con episodios depresivos leves

Duración { al menos 2 años de duración

Sentirse tristes desesperados o vacío

síntomas { ganas de llorar, irritabilidad, especialmente en niños y adolescentes.

Perdida.

Causas {

1.-Suele repetirse en familia

2.-Diferencias en la manera en que funciona el cerebro, cambios en la neurobiología del cerebro.

3.-problemas ambientales, tales como experiencias traumáticas o periodos prolongados.

Trastorno de desregulación disruptiva del estado de ánimo

Depresión grave

Período de dos semanas de un estado de ánimo deprimido o irritable o una marcada disminución en el interés o placer por las actividades habituales, junto con otros signos de un trastorno del estado de ánimo

Distimia
(trastorno distímico)

Estado de ánimo crónico, bajo, deprimido o irritable que perdura por lo menos durante un año

Síndrome
Maníaco depresivo (trastorno bipolar)

Por lo menos un episodio de estado de ánimo deprimido o irritable y un período de un estado de ánimo maníaco (persistentemente elevado)

Trastorno del estado de Animo debido a una Condición medica general.

Muchas enfermedades médicas (incluyendo el cáncer, lesiones, infecciones y enfermedades médicas crónicas) pueden desencadenar los síntomas de depresión

Trastorno de ánimo
Producida por sustancias

Síntomas de depresión debidos a los efectos de la medicación, abuso de drogas, exposición a toxinas u otras formas de tratamiento.

Síndrome maníaco depresivo
(trastorno bipolar)

Son la expresión de labilidad afectiva, disforia y síntomas de ansiedad que se repiten durante la fase premenstrual del ciclo y que remiten alrededor del inicio de la menstruación o poco después.

Síntomas

afectivos y de ansiedad, también aparecen síntomas conductuales y somáticos

Distimia (trastorno distímico) Síndrome maníaco-depresivo (trastorno bipolar)

Trastorno del estado de ánimo debido a una condición médica general

Trastorno del estado de ánimo producido por sustancias

período de dos semanas de un estado de ánimo deprimido o irritable o una marcada disminución en el interés o placer por las actividades habituales, junto con otros signos de un trastorno del estado de ánimo. estado de ánimo crónico, bajo, deprimido o irritable que perdura por lo menos durante una año por lo menos un episodio de estado de ánimo deprimido o irritable y un período de un estado de ánimo maníaco (persistentemente elevado). muchas enfermedades médicas (incluyendo el cáncer, lesiones, infecciones y enfermedades médicas crónicas) pueden desencadenar los síntomas de depresión. síntomas de depresión debidos a los efectos de la medicación, abuso de drogas, exposición a toxinas u otras formas de tratamiento.

SINTOMAS GENERALES

Sentimientos persistentes de tristeza.

- Sentimiento de desesperanza o desamparo.
- Baja autoestima. • Sensación de ineptitud.

- Culpabilidad excesiva. • Deseos de morir. • Pérdida de interés en actividades habituales o actividades que antes se disfrutaban.
- Dificultad en las relaciones.
- Perturbación del sueño (por ejemplo, insomnio, hipersomnio)
- Cambios del apetito o del peso.
- Molestias físicas frecuentes (por ejemplo, dolor de cabeza, dolor de estómago, fatiga).
- Intentos o amenazas de escaparse del hogar.