



UDS

Mi Universidad

Nombre del Alumno: Ilsi Gabriela Aguilar Gonzales

Nombre del tema: Trastorno obsesivo compulsivo, relacionados con traumas y factores de estrés y disociativos.



Nombre de la Materia: psicopatología

Nombre del profesor: María del Carme Briones Martínez

Nombre de la Licenciatura: Lic. Psicología

Cuatrimestre: 6to cuatrimestre.

psicología

...e un individuo se siente
...izar en respuesta a una
...esión.

...vo es reducir
...da por las obsesiones o
...ntecimiento temido

...se realizan típicamente
...na obsesión (p. ej., los
...escontaminación que
...rituales de lavado o,
...orrecto, se produce una
...les hasta que se siente
...orrecto").

Los síntomas
obsesivo-
compulsivos no se
pueden atribuir a
los efectos
fisiológicos de una
sustancia

...n no se explica
...os síntomas de

Trastorno dismórfico corporal

Los individuos con trastorno dismórfico corporal (históricamente conocido como dismorfofobia) están preocupados por uno o más defectos percibidos en su apariencia física, por lo que se ven feos, poco atractivos, anormales o deformes

Las preocupaciones pueden centrarse en una o varias zonas del cuerpo, más comúnmente en la piel la percepción de acné, cicatrices, líneas, arrugas, palidez, el pelo "adelgazamiento" del pelo o "excesivo" vello facial o en el cuerpo o la nariz, el tamaño o la forma. Sin embargo, cualquier área del cuerpo puede ser el foco de preocupación

La dismorfia muscular es una forma de trastorno dismórfico corporal que ocurre casi

Trastorno de acumulación

...son las dificultades persistentes para deshacerse o separarse de las posesiones, independientemente de su valor real. El término persistente indica una dificultad de larga duración en vez de las circunstancias de vida más transitorias que pueden conducir al desorden excesivo

La dificultad para deshacerse de las posesiones señaladas en el Criterio A se refiere a cualquier forma de descarte,

Las personas que acumulan un gran número de artículos abarrotan y desordenan las zonas de vida

Tricotilomanía

La caracter
tricotilom
arrancarse
recurrente de

el acto de ar
afectar a c
cuerpo en la
localizac
el cuero cab
párpados, m
menos
vello axilar, e
de las regi

El acto de
puede apa
episodios
durante todo
menos fre

Trastorno de excoiación

La característica clínica esencial del trastorno de excoiación (o de rascado de la piel) es el rascado de la piel. Los sitios más afectados son la cara, los brazos y las piernas, pero muchas personas rascan otras partes del cuerpo. Las personas con este trastorno rascarse la piel sana.

El rascado de la piel requiere que rascarse la piel conduzca a lesiones en la piel, aunque las personas con este trastorno a menudo tratan de ocultar o camuflar dichas lesiones.

El malestar incluye sentimientos negativos de la piel que pueden ser dolorosos.

Trastorno obsesivo compulsivo y relacionados debido a otra afección médica

La característica clínica esencial del trastorno obsesivo-compulsivo y los trastornos relacionados debidos a otra afección médica es la presencia de síntomas obsesivo compulsivos significativos y afines cuya mejor explicación es que son consecuencia fisiopatológica directa de otra afección médica.

Los síntomas pueden consistir en obsesiones prominentes, compulsiones, preocupaciones por la apariencia, acumulación, arrancarse el pelo, pellizcarse la piel o cualquier otra conducta repetitiva y centrada en el cuerpo.

Existe cierta controversia sobre si los trastornos

Trastorno de apego reactivo

El trastorno de apego reactivo de la lactancia o la primera infancia se caracteriza por un patrón de conductas de apego notablemente alterado e inadecuado para el desarrollo, en el que el niño raramente recurre a una figura de apego para su comodidad, apoyo, protección y crianza.

La característica esencial es la ausencia de apego o un apego muy poco desarrollado entre el niño y sus cuidadores.

Los niños con trastorno de apego reactivo muestran una expresión ausente o disminuida de las emociones positivas durante las interacciones.

Trastorno de apego reactivo

La característica esencial del trastorno de apego reactivo de la lactancia o la primera infancia es un patrón de conductas de apego notablemente alterado e inadecuado para el desarrollo, en el que el niño raramente recurre a una figura de apego para su comodidad, apoyo, protección y crianza.

Por esta razón, el niño puede tener un desarrollo de apego alterado.

Patrón de conductas de apego que un niño se espera que muestre.

Trastornos de estrés y disociativos.

Trastorno de estrés traumático

La característica esencial del trastorno de estrés traumático (TEPT) es el desarrollo de síntomas característicos tras la exposición a eventos traumáticos.

Las alteraciones en las cogniciones negativas o en los estados de ánimo asociados con el evento comienzan o empeoran después de la exposición al mismo

Individuos con trastorno de estrés traumático pueden

Trastorno de estrés agudo

La característica esencial del trastorno de estrés agudo es el desarrollo de síntomas característicos con una duración de 3 días a 1 mes tras la exposición a uno o más eventos traumáticos.

La presentación clínica del trastorno de estrés agudo puede variar según la persona, pero normalmente implica una respuesta de ansiedad que incluye alguna forma de revivir el suceso traumático o de reactividad al evento traumático.

Es muy común que las personas con trastorno

Trastorno de adaptación

La presencia de síntomas emocionales o comportamentales en respuesta a un factor de estrés identificable es la característica esencial de los trastornos de adaptación

Los factores de estrés pueden afectar a un solo individuo, a una familia entera, o

Los trastornos de adaptación se pueden diagnosticar después de la muerte de un ser querido, cuando la intensidad, la

Trastorno de identidad

La característica esencial del trastorno de identidad es la presencia de dos o más estados de personalidad distintos o

La amnesia de las personas con trastorno de identidad disociativa se presenta en forma

1) como lagos de memoria remota de los eventos vitales

2) como lapsos

Trastorno disociativo

Definitiva de la amnesia
Incapacidad para recordar
parte autobiográfica que:
no se puede recordar con éxito en la
memoria,
pero que debería ser recordada
fácilmente

La amnesia localizada
es la incapacidad de
recordar hechos
durante un período
restringido
de tiempo

La amnesia
selectiva, el individuo

Trastorno de despersonalización

Las características esenciales del
trastorno de despersonalización/
desrealización son
episodios persistentes o
recurrentes de
despersonalización, desrealización
o ambas.

Los
episodios de despersonalización se
caracterizan por una sensación de
irrealidad o
extrañeza, o un distanciamiento de
uno mismo en general, o de algunos
aspectos del yo.

Los episodios de desrealización se caracterizan por una

Otros trastornos obsesivo- compulsivos y trastornos relacionados especificados

Esta categoría se aplica a presentaciones en las
que predominan los síntomas característicos de
un trastorno obsesivo-compulsivo y trastornos
relacionados que causan malestar clínicamente
significativo o deterioro en lo social, laboral u
otras áreas importantes del funcionamiento

**Trastorno obsesivo-
compulsivo y trastornos
relacionados no
especificados:** se utiliza
en situaciones en las que
el clínico opta por no
especificar el motivo del
incumplimiento de los

**Otro trastorno
relacionado con
traumas y factores de
estrés especificado:** se
aplica a presentaciones
en las que predominan
los síntomas
característicos de un

Trastorno traumático de estrés

La categoría del
trastorno
traumático
de estrés no esp
se aplica a
situaciones en las
que el individuo
ha estado expuesto
al motivo de incur
de un trastorno n
factores d

Otros tra

Esta categoría
se aplica a
presentaciones
en las que p
característicos
de los trastornos
que causan
malestar clínicamente
significativo

Trastor