



Mi Universidad

CUADRO COMPARATIVO

Nombre de la Alumna: María Guadalupe Perez Perez

Nombre del tema: Tipos de infección en la piel adulto mayor

Parcial: 2 do parcial

Nombre de la Materia: Enfermería Gerontogeriatrica

Nombre del profesor: Cecilia D e La Cruz

Nombre de la Licenciatura: Lic. Enfermería

Cuatrimestre: 6to cuatrimestre

TIPOS DE INFECCION EN LA PIEL ADULTO MAYOR

	FISIOPATOLOGIA	ETIOLOGIA	CUADRO CLINICO	TRATAMIENTO
ERISIPELA	Es un tipo de infección de la piel. Afecta la capa superior de la piel y los ganglios linfáticos locales. Las bacterias entran en la barrera cutánea afectada (e.g., úlcera, ampolla, mordedura de perro). La invasión de la dermis superior produce eritema y aumento de volumen local de la piel (edema).	Causada principalmente por la bacteria <i>Streptococcus pyogenes</i> , la erisipela ataca las capas más superficiales de la piel y puede extenderse a los vasos linfáticos cutáneos superficiales.	Fiebre y escalofrío Úlcera cutánea con un borde definido y elevado. A medida que la infección se extiende, hay mucho dolor, enrojecimiento, hinchazón y calor en la piel. Pueden formarse ampollas en la piel.	<ul style="list-style-type: none"> • Antibióticos orales o parenterales • Penicilina • Amoxicilina • Cefalexina • Cefadroxilo
FASCITIS NECROSANTE	es una infección bacteriana grave y rara, en la cual existe inflamación y muerte del tejido que se encuentra debajo de la piel y que envuelve los músculos, nervios y vasos sanguíneos, llamado fascia. Una vez que los microorganismos irrumpen el tejido subcutáneo y la fascia liberan toxinas y enzimas. Las enzimas del <i>Streptococcus pyogenes</i> denominadas factor antifagocítico (proteína M y ácido hialurónico), así como los productos que facilitan la destrucción de tejidos (estreptolisina O y S) provocan licuefacción del material hematopurulento existente en la zona de inflamatoria	ocurre, principalmente, por bacterias del tipo <i>Streptococcus</i> del grupo A, siendo más frecuente debido al <i>Streptococcus pyogenes</i> . (DNAasa, streptoquinasa, proteinasa) y digieren el tejido conectivo (hialuronidasa), permitiendo rápida diseminación de la infección sobre los planos tisulares	<ul style="list-style-type: none"> • Enrojecimiento e hinchazón en cierta zona de la piel, • Dolor intenso, • Fiebre; • Aparición de úlceras y ampollas; • Oscurecimiento de la región; • Diarrea; • Náuseas; • Presencia de pus en la herida 	<ul style="list-style-type: none"> • antibióticos por vía intravenosa para combatir la infección. • cirugía para remover el tejido afectado

TIPOS DE INFECCION EN LA PIEL ADULTO MAYOR

	FISIOPATOLOGIA	ETIOLOGIA	CUADRO CLINICO	TRATAMIENTO
CELULITIS	<p>infecciosa es una infección cutánea bacteriana común y potencialmente seria. La piel afectada está hinchada e inflamada y, por lo general, duele y se siente caliente al tacto</p>	<p>La celulitis infecciosa se produce cuando las bacterias, con mayor frecuencia los estreptococos y estafilococos, ingresan en la piel a través de una grieta o rotura.</p>	<p>Un área irritada de la piel que tiende a expandirse. Hinchazón.</p> <ul style="list-style-type: none"> • Sensibilidad. • Dolor. • Sensación de calor. • Fiebre. • Escalofríos. • Manchas. Ampollas. 	<p>Comprende un antibiótico oral recetado. Deberás tomar el antibiótico por el período recetado completo entre 5 y 10 días, incluso si comienzas a sentirte mejor</p>
HERPES	<p>es una infección viral que causa una erupción dolorosa. Los herpes zóster pueden aparecer en cualquier parte del cuerpo. Por lo general, parece una sola franja de ampollas que envuelve el lado izquierdo o derecho del torso.</p>	<p>La causa del herpes zóster es el virus varicela-zóster, el mismo virus que provoca la varicela. Cualquiera que haya tenido varicela puede desarrollar herpes zóster. Después de recuperarte de la varicela, el virus ingresa en el sistema nervioso y permanece inactivo durante años.</p>	<ul style="list-style-type: none"> • Dolor, ardor u hormigueo. • Sensibilidad al tacto. • Sarpullido rojo • Ampollas llenas de líquido que se abren y forman costras. • Picazón. • Fiebre. • Dolor de cabeza. • Sensibilidad a la luz. • Fatiga. 	<ul style="list-style-type: none"> • Tratamiento sintomático • Antivirales (aciclovir, famciclovir, valaciclovir), especialmente en los pacientes inmunodeficientes • Anestésicos, como la lidocaína, en crema, gel, spray o parche para la piel • Antidepresivos tricíclicos, como la amitriptilina

TIPOS DE INFECCION EN LA PIEL ADULTO MAYOR

	FISIOPATOLOGIA	ETIOLOGIA	CUADRO CLINICO	TRATAMIENTO
ÚLCERAS POR PRESIÓN	Las escaras son lesiones de la piel y del tejido que se encuentra debajo de la piel debidas a la presión ejercida sobre esta durante un tiempo prolongado.	Edad > 65 años Disminución de la movilidad Exposición a sustancias irritantes de la piel Alteración de la capacidad para la cicatrización de heridas	<ul style="list-style-type: none">• Cambios en el color o en la textura de la piel.• Hinchazón.• Supuración.• Un área de la piel que se siente más fría o más caliente al tacto que otras áreas.• Áreas con irritación.	<ul style="list-style-type: none">• Disminución de la presión• Cuidados directos de la herida• Manejo del dolor• Control de la infección• Evaluación de las necesidades nutricionales• Tratamiento adyuvante o cirugía

REFERENCIA BIBLIOGRAFICA

- <https://www.mayoclinic.org/es/diseases-conditions/cellulitis/symptoms-causes/syc-20370762>
- http://www.scielo.org.bo/scielo.php?script=sci_arttext&pid=S1024-06752003000200006
- https://www.merckmanuals.com/es-us/professional/enfermedades-infecciosas/virus-herpes/herpes-z%C3%B3ster#Tratamiento_v1019826_es
- <https://www.infomed.scu.sld.cu/celulitis-una-guia-para-la-practica-fisiopatologia-presentacion-clinica-y-tratamiento/>
- <https://app.lecturio.com/#/article/2762>
- http://www.scielo.org.bo/scielo.php?script=sci_arttext&pid=S1024-06752003000200006
- https://www.msdmanuals.com/es-mx/professional/trastornos%20dermatol%C3%B3gicos/lesi%C3%B3n-por-presi%C3%B3n/lesiones-por%20presi%C3%B3n#Tratamiento_v967099_es
- <https://app.lecturio.com/#/article/3355>