



Mi Universidad

Nombre de la Alumna: Fabiola López López

Nombre del tema: Tipos de Demencias en el adulto Mayor

Parcial: 2do


Nombre de la Materia: Enfermería del Adulto Mayor

Nombre del profesor: Cecilia de la Cruz Sanchez

Nombre de la Licenciatura: Enfermería

Cuatrimestre: 6to

Mapa Conceptual



TIPOS DE DEMENCIA EN EL ADULTO MAYOR

CONCEPTO

La demencia es una pérdida de las funciones mentales lo suficientemente graves como para afectar sus actividades y su vida diaria.

ENFERMEDAD DE ALZHEIMER

La forma más común de demencia entre personas mayores. Esta afección causa placa y ovillos en el cerebro provocados por el crecimiento anormal de diferentes proteínas. La proteína beta-amiloide se acumula y forma placa entre sus células cerebrales.

DEMENCIA VASCULAR

Causa cambios en el flujo de sangre del cerebro. A menudo es causado por un derrame cerebral o arterioesclerosis (endurecimiento de las arterias) en el cerebro

DEMENCIA CON CUERPOS DE LEWY

Se trata de una enfermedad provocada por la degeneración y muerte de las neuronas cerebrales, con la particularidad de que se observa la presencia de unas proteínas esféricas anormales llamadas cuerpos de Lewy, las cuales se desarrollan dentro de las neuronas.

DEMENCIA FRONTOTEMPORAL

Causan cambios en ciertas partes del cerebro:

- Los cambios en el lóbulo frontal conducen a síntomas del comportamiento
- Los cambios en el lóbulo temporal conducen a trastornos del lenguaje y emocionales

DEMENCIA MIXTA:

Es una combinación de dos o más tipos de demencia. Por ejemplo, algunas personas tienen enfermedad de Alzheimer y demencia vascular

CREUTZFELDT-JAKOB

Trastorno cerebral poco frecuente. está causada por un prión, el tipo de patógeno más sencillo de la naturaleza, siendo simplemente una proteína con capacidad infectiva.

DEMENCIA VINCULADA AL ALCOHOL

Demencia en la que el daño neurológico está causado por el consumo excesivo de alcohol.

DEMENCIA VINCULADA AL SIDA

aparece por complejas interacciones entre síntomas mentales y neurológicos. El 7% de los pacientes en etapas avanzadas sin recibir medicación antirretroviral la desarrollan.

ENFERMEDAD DE HUNTINGTON

es un trastorno genético y hereditario en el que, debido a errores en distintos genes, se produce un progresivo deterioro de las neuronas cerebrales

ENCEFALOPATÍA TRAUMÁTICA CRÓNICA

demencia que tiene un origen traumatológico. los cambios cognitivos y psicológicos aparecen por repetitivos traumatismos craneales.

DEMENCIA POR ENFERMEDAD DE PARKINSON

es una enfermedad neurológica, afecta a las habilidades motoras a causa de una progresiva degeneración del sistema nervioso. cuando su capacidad de control muscular está más afectada, que puede surgir, en algunos casos, la demencia.

DEMENCIA MULTIINFARTO

se desarrolla después de varios episodios de ictus, accidentes cerebrovasculares o infartos cerebrales, los cuales pueden incluso ser asintomáticos pero dejar regiones cerebrales dañadas que, eventualmente y como secuela, pueden dar lugar a la aparición brusca de la demencia.

QUIÉN ESTÁ EN RIESGO DE DEMENCIA


- Envejecimiento:
- Fumar
- Diabetes sin controlar
- Presión arterial alta
- Beber demasiado alcohol
- Tener familiares cercanos con demencia

SÍNTOMAS

- Perderse en un vecindario que conocen
- Usar palabras poco comunes para referirse a objetos conocidos
- Olvidar el nombre de algún familiar o amigo
- Olvidar los viejos recuerdos
- Necesitar ayuda para realizar tareas que solían hacer solos



TIPOS DE DEMENCIA EN EL ADULTO MAYOR



DIAGNOSTICO

- Su historia clínica, incluyendo preguntas sobre sus síntomas
- Un examen físico
- Pruebas para evaluar su habilidad de pensamiento, memoria y lenguaje

CUIDADOS

- Evitar entrenar al paciente en conseguir habilidades perdidas, ya que incrementa la sensación de fracaso y la irritabilidad.

La demencia o trastorno neurocognitivo mayor es un síndrome que, por lo general, se da a una edad avanzada (personas mayores de 60 años), caracterizado por la pérdida de la función cerebral que ocurre a causa de ciertas enfermedades.

DIAGNOSTICO

- Otros exámenes, como pruebas de sangre, análisis genéticos y escáners cerebrales
- Una evaluación de salud mental para ver si una enfermedad mental puede estar causando sus síntomas

- Permitir al paciente comportamientos habituales, como el acaparamiento de objetos o el vagabundeo, siempre que se realicen en un ambiente seguro.

Esto afecta a una o más funciones cerebrales como la memoria, el pensamiento, el lenguaje, el juicio o el comportamiento.

TRATAMIENTO

- Medicamentos
- Terapia ocupacional
- Terapia del habla
- Consejería sobre salud mental
- Música o terapia de arte

CUIDADOS

- Valorar en el paciente signos y síntomas de depresión.

Debido a las áreas personales que limita dicha patología, cabe destacar que el personal de Enfermería juega un papel fundamental en tratamiento y la evolución de dicha enfermedad.

CUIDADOS DE ENFERMERÍA

- Programar planes de cuidados individualizados con el objetivo de favorecer el mantenimiento de las capacidades del paciente el mayor tiempo posible.

- Colocar etiquetas u otras ayudas visuales con el nombre de objetos, ayudándole a recordar su función.



- Proporcionar al paciente un ambiente coherente y rutinario, para ayudarlo a funcionar con sus capacidades disminuidas.

CUIDADOS

- Colocar un reloj y un calendario grande en su cuarto y marcar con una X los días pasados, ayudándole a recordar la fecha correcta.

REFERENCIAS BIBLIOGRÁFICAS

- <https://medlineplus.gov/spanish/dementia.html>
- <https://medicoplus.com/neurologia/tipos-demencia>
- <https://revistamedica.com/cuidados-enfermeria-individualizados-demencia/amp/>