



Mi Universidad

Cuadro Comparativo

Nombre del Alumno: Densee Lineth Bautista Peralta.

Nombre del tema: Tipos De Infecciones De La Piel En El Adulto Mayor.

Parcial: 2do parcial.

Nombre de la Materia: Enfermería Gerontogeriatrica.

Nombre del profesor: Cecilia De La Cruz Sánchez.

Nombre de la Licenciatura: Enfermería.

Cuatrimestre: 6to Cuatrimestre.

TIPOS DE DEMENCIA EN EL ADULTO MAYOR

CONCETO

La demencia no es una enfermedad específica sino, más bien, un término general para referirse a una alteración de la capacidad para recordar, pensar o tomar decisiones, que interfiere en la realización de las actividades de la vida diaria

CUADRO CLINICO

Los signos que podrían indicar demencia incluyen:

- Perdersse en un vecindario conocido
- Usar palabras inusuales al mencionar objetos conocidos
- Olvidarse del nombre de un familiar o amigo cercano
- Olvidarse de viejos recuerdos
- No poder completar tareas de manera independiente



Las personas con demencia tienen problemas con lo siguiente:

- Memoria
- Atención
- Comunicación
- Razonamiento, criterio y resolución de problemas
- Percepción visual, más allá de los típicos cambios en la vista que están relacionados con la edad



TIPOS DE DEMENCIA EN EL ADULTO MAYOR

Factores de riesgo

Algunos factores pueden aumentar su riesgo de demencia, incluyendo:

- Envejecimiento: Este es el mayor factor de riesgo de demencia
- Fumar
- Diabetes sin controlar
- Presión arterial alta
- Beber demasiado alcohol
- Tener familiares cercanos con demencia

Métodos de diagnóstico

Para hacer un diagnóstico, su profesional de la salud puede utilizar:

- Su historia clínica, incluyendo preguntas sobre sus síntomas
- Un examen físico
- Pruebas para evaluar su habilidad de pensamiento, memoria y lenguaje
- Otros exámenes, como pruebas de sangre, análisis genéticos y escáners cerebrales
- Una evaluación de salud mental para ver si una enfermedad mental puede estar causando sus síntomas

TIPOS DE DEMENCIA EN EL ADULTO MAYOR

TIPOS

Enfermedad de Alzheimer

El síntoma característico es tener dificultad para acordarse de hechos recientes. Esta afección causa placa y ovillos en el cerebro provocados por el crecimiento anormal de diferentes proteínas. La proteína beta-amiloide se acumula y forma placa entre sus células cerebrales. También hay una pérdida de conexión entre las células nerviosas del cerebro

Demencia vascular

Causa cambios en el flujo de sangre del cerebro. A menudo es causado por un derrame cerebral o arterioesclerosis (endurecimiento de las arterias) en el cerebro

Demencia con cuerpos de Lewy.

Los cuerpos de Lewy son acumulaciones de proteína en forma de globo. Entre los síntomas más comunes están la actuación física de los sueños y ver cosas que no son reales, lo que se conoce como alucinaciones visuales. También se incluyen los problemas de concentración y atención. Otros signos incluyen movimientos descoordinados o lentos, temblores y rigidez, lo que se conoce como parkinsonismo.



TIPOS DE DEMENCIA EN EL ADULTO MAYOR

TIPOS

Demencia frontotemporal.

Este es un grupo de enfermedades caracterizadas por la ruptura de las células nerviosas y sus conexiones en los lóbulos frontal y temporal del cerebro. Estas zonas se asocian con la personalidad, la conducta y el lenguaje. Los síntomas más comunes afectan el comportamiento, la personalidad, el pensamiento, el juicio, el lenguaje y el movimiento.




Parkinson con demencia

Entre el 20 y el 30% de las personas con Parkinson también desarrollan síntomas de demencia.



Demencia Mixta

Las personas con demencia mixta pueden tener la enfermedad de Alzheimer, demencia vascular y demencia con cuerpos de Lewy.



TIPOS DE DEMENCIA EN EL ADULTO MAYOR

TIPOS

Enfermedad de Creutzfeldt–Jakob.

Este raro trastorno cerebral generalmente ocurre en personas sin factores de riesgo conocidos. Esta afección puede deberse a depósitos de proteínas infecciosas denominadas priones.

Lesión cerebral por traumatismo.

Esta afección es causada con mayor frecuencia por traumatismos craneales repetitivos. Personas como boxeadores, jugadores de fútbol americano o soldados pueden presentar lesiones cerebrales por traumatismo.

Enfermedad de Huntington.

La causa de la enfermedad de Huntington es una alteración genética. La enfermedad hace que ciertas células nerviosas en el cerebro y la médula espinal se debiliten. Los síntomas incluyen el deterioro de las habilidades de pensamiento denominadas habilidades cognitivas.



TIPOS DE DEMENCIA EN EL ADULTO MAYOR

Tipos que pueden revertirse

Infecciones y trastornos inmunitarios.

Los síntomas similares a la demencia pueden ser el resultado de la fiebre u otros efectos secundarios del intento del cuerpo de combatir una infección. La esclerosis múltiple y otras afecciones causadas por el sistema inmunitario del cuerpo, que ataca las células nerviosas, también pueden causar demencia.

Problemas metabólicos o endócrinos.

Las personas con problemas de tiroides y bajo nivel de glucosa en la sangre pueden presentar síntomas similares a la demencia u otros cambios en la personalidad. Lo mismo ocurre con las personas que tienen demasiado o muy poco sodio o calcio, o problemas para absorber la vitamina B-12.

Niveles bajos de ciertos nutrientes.

La ingesta insuficiente de ciertas vitaminas o minerales en la alimentación puede causar síntomas de demencia. Esto incluye no obtener suficiente tiamina, también conocida como vitamina B-1, incluye no ingerir suficiente vitamina B-6, vitamina B-12, cobre o vitamina E. No beber suficientes líquidos, lo que produce deshidratación, también puede causar síntomas de demencia.

TIPOS DE DEMENCIA EN EL ADULTO MAYOR

Tipos que pueden revertirse

Efectos secundarios de los medicamentos.

Los efectos secundarios de los medicamentos, una reacción a un medicamento o una interacción de varios medicamentos pueden causar síntomas similares a la demencia.

Sangrado subdural.

El sangrado entre la superficie del cerebro y la capa que lo recubre puede ser común en adultos mayores tras una caída. El sangrado subdural puede causar síntomas similares a los de la demencia.

Tumores cerebrales y Hidrocefalia de presión normal

En raras ocasiones, la demencia puede ser el resultado del daño causado por un tumor cerebral.

Hidrocefalia de presión normal. Esta afección es una acumulación de líquido dentro de las cavidades del cerebro, conocidas como ventrículos. Puede provocar problemas para caminar, pérdida del control de la vejiga y pérdida de la memoria.

Bibliografias

<https://medlineplus.gov/spanish/dementia.html>

<https://www.mayoclinic.org/es/diseases-conditions/dementia/symptoms-causes/syc-20352013>

<https://www.cdc.gov/aging/spanish/features/dementia.html>

<https://www.fundacionfass.org/general/tipos-de-demencia-en-personas-mayores/>