

Mi Universidad

Nombre del Alumno: Fernanda cruz Pérez

Nombre del tema TIPOS DE INFECCION
DE LA PIEL EN EL ADULTO MAYOR


Parcial: 1

Nombre de la Materia: ENFERMERIA
GERONTOGERIATRICA

Nombre del profesor: Cecilia De la cruz
Sánchez

Nombre de la Licenciatura: Enfermería
Cuatrimestre: 6

TIPOS DE INFECCION DE LA PIEL EN EL ADULTO MAYOR



NEUMONÍA

Es una de las infecciones más frecuentes y graves en la etapa geriátrica, con unas tasas de mortalidad de dos a tres veces superiores al resto de la población, y que pueden llegar al 20-30% según diversas series; es la primera causa de muerte en los pacientes afectados de demencia.

Una serie de cambios fisiológicos relacionados con el envejecimiento, como son la disminución del reflejo tusígeno, la pérdida de fuerza muscular, las alteraciones de la función mucociliar, la presencia de reflujo gastroesofágico y la alteración del reflejo deglutorio, facilitan su desarrollo



INFECCIÓN DEL TRACTO URINARIO

Es el proceso infeccioso más común en el anciano y la causa más frecuente de bacteriemia. No se observan diferencias en cuanto a la incidencia por sexos. Es el proceso infeccioso más prevalente en los pacientes institucionalizados (20-50%).

El anciano presenta múltiples factores predisponentes para su desarrollo, como son: la incontinencia urinaria o rectal, la instrumentalización genitourinaria (sondajes), la hipertrofia prostática, los cambios hormonales posmenopáusicos que condicionan cambios en la flora vaginal o la pérdida del poder bactericida de las secreciones prostáticas del varón.



INFECCIÓN DEL SISTEMA NERVIOSO CENTRAL

La meningitis es una entidad clínica frecuente en el anciano, hasta un 56% de las meningitis adquiridas aparecen en pacientes mayores de 50 años, con una elevada tasa de mortalidad que oscila entre el 37 y el 55%.

En el anciano la posibilidad de que los microorganismos alcancen las meninges a partir de una bacteriemia es mayor que en los pacientes jóvenes. Además, la propagación a partir de focos infecciosos por contigüidad (otitis, sinusitis, mastoiditis) también es más frecuente.

TIPOS DE INFECCION DE LA PIEL EN EL ADULTO MAYOR



ENDOCARDITIS INFECCIOSA

El diagnóstico de la endocarditis infecciosa es difícil, debido a que el cuadro clínico suele estar más superpuesto y la existencia de fiebre o leucocitosis es menos frecuente. En estos pacientes la presencia de fenómenos embólicos es más habitual.

En nuestro medio más de la mitad de los pacientes con endocarditis son mayores de 65 años, la mayoría asociada a enfermedad valvular degenerativa (70%) y el resto a endocarditis sobre válvula protésica (30%). Los gérmenes más frecuentes son *S. viridans*, *E. faecalis* y los bacilos gramnegativos. *Staphylococcus plasmocoagulasa negativo*,



INFECCIONES CUTÁNEAS

La infección de la piel y los tejidos blandos son la tercera causa de infección en el anciano; además, algunos de estos procesos son muy específicos de este grupo de edad.

La celulitis, la erisipela, la fascitis necrosante, las complicaciones infecciosas del pie diabético y la infección de las úlceras por presión son los procesos más usuales en el anciano.



ULCERA POR PRESION

Las úlceras por presión se presentan con elevada frecuencia en el paciente institucionalizado (del 2 al 16% según las series), acompañadas con frecuencia de infección, lo que conlleva una elevada morbimortalidad y a la vez una dificultad en el manejo.

La aparición de cambios en el aspecto del exudado de las úlceras (color, cantidad, olor), el enrojecimiento de sus bordes, la aparición de dolor local o de fiebre, son indicadores de infección activa (fig. 1). Si ésta deriva en infección ósea o sepsis, la mortalidad puede alcanzar hasta el 50% de los casos.