



**Mi Universidad**

## **Cuadro Comparativo**

*Nombre del Alumno: Denisse Velázquez Morales*

*Nombre del tema: Tipos de Infección de la Piel en el Adulto Mayor*

*Nombre de la Materia: Enfermería Gerontogeriatrica*

*Nombre del profesor: Lic. Cecilia de la Cruz Sánchez*

*Nombre de la Licenciatura: Enfermería*

*Cuatrimestre: 6to. C*

*Pichucalco, Chiapas a 26 de Julio 2024*

## Infecciones Bacterianas en la Piel del Adulto Mayor

Patología	¿Qué es?	Síntomas	Causa	Factores de Riesgo	Imagen
<b>Celulitis Infecciosa</b>	Infección cutánea bacteriana común, la piel afectada está hinchada e inflamada y, por lo general, duele y se siente caliente al tacto.	<p>área irritada de la piel que tiende a expandirse.</p> <p>Hinchazón.</p> <p>Sensibilidad.</p> <p>Dolor.</p> <p>Sensación de calor.</p> <p>Fiebre.</p> <p>Escalofríos.</p> <p>Manchas.</p> <p>Ampollas.</p> <p>Piel de naranja.</p>	Se produce cuando las bacterias, con mayor frecuencia los estreptococos y estafilococos, ingresan en la piel a través de una grieta o rotura.	<p>Lesiones.</p> <p>Sistema inmunitario debilitado.</p> <p>Enfermedades de la piel.</p> <p>Hinchazón prolongada (crónica) en los brazos o las piernas (linfedema)</p> <p>Antecedentes de celulitis</p> <p>Sobrepeso.</p>	
<b>Impétigo</b>	Es causado por las bacterias estreptococos o estafilococos. El Staphylococcus aureus	Una o más ampollas que están llenas de pus y son fáciles de reventar, que causan comezón están llenas de un líquido amarillo, que supuran y forman costras	En los adultos, puede ocurrir después de otro problema de la piel. También se puede desarrollar después de un resfriado u otro virus.	<p>Diseminación de la infección a otras partes del cuerpo (con frecuencia)</p> <p>Daño permanente en la piel y cicatrización</p>	
<b>forúnculo</b>	protuberancia dolorosa y llena de pus que se forma debajo de la piel cuando las bacterias infectan y causan la inflamación de uno o más folículos del vello.	<p>Una protuberancia roja y dolorosa que comienza siendo pequeña y puede agrandarse.</p> <p>Piel rojiza o morada e hinchada alrededor de la protuberancia.</p> <p>Llena de pus</p> <p>Formación de una punta de color blanco amarillento</p>	Se producen por el Staphylococcus aureus, un tipo de bacteria que normalmente se encuentra en la piel y dentro de la nariz. Se forma una protuberancia a medida que el pus se acumula debajo de la piel.	<p>Contacto cercano con una persona que tiene una infección por estafilococos</p> <p>Diabetes.</p> <p>Otras afecciones de la piel</p> <p>Inmunidad comprometida</p>	

## Infecciones Bacterianas en la Piel del Adulto Mayor

Patología	¿Qué es?	Síntomas	Causa	Factores de Riesgo	Imagen
<p style="font-size: 2em; font-weight: bold; margin: 0;">Lepra</p>	<p>La lepra afecta sobre todo la piel y los nervios periféricos. Las complicaciones más graves son las que resultan de la pérdida del sentido del tacto, de la sensación de dolor y la temperatura; la debilidad muscular que puede causar deformidades; y las lesiones desfigurantes de la piel y la mucosa nasal.</p>	<p>Suelen manifestarse hasta &gt; 1 año después de la infección</p> <p>La lepra afecta sobre todo la piel y los nervios periféricos.</p> <p>El compromiso nervioso produce entumecimiento y debilidad en las áreas controladas por los nervios afectados.</p>	<p>se transmite por fluidos corporales de la nariz y boca de aquellas personas en contacto frecuente con personas enfermas no tratadas.</p>	<p>Nutrición, hacinamiento y susceptibilidad inmunológica de la persona infectada.</p> <p>Existen otros determinantes como el ambiente físico, social y económico.</p>	

## Infecciones Virales en la Piel del Adulto Mayor

Patología	¿Qué es?	Síntomas	Causa	Factores de Riesgo	Imagen
<b>Culebrilla (Herpes Zóster)</b>	Cualquier persona que haya tenido varicela corre el riesgo de padecer culebrilla. Pero este riesgo aumenta a medida que envejece.	Ardor o dolor punzante y hormigueo o picazón. En general, se presenta a un lado del cuerpo o la cara. El dolor puede ser de leve a severo.	Puede causar otros problemas: Neuralgia posherpética: Causa dolor intenso en las áreas donde tuvo la erupción de culebrilla. Si la culebrilla afecta sus ojos puede tener pérdida de la visión. Puede ser temporal o permanente Problemas de audición o equilibrio: Son posibles si tiene culebrilla dentro o cerca de su oído.	La culebrilla es más común en personas mayores de 50 años. Las personas con sistemas inmunitarios débiles tienen un mayor riesgo de tener culebrilla. Esto incluye a aquellos que:  Tienen enfermedades del sistema inmunitario como el VIH Tienen ciertos tipos de cáncer Toma medicamentos que debilitan su sistema inmunitario.	
<b>Varicela</b>	se caracteriza por un dolor neurológico muy intenso y una erupción con ampollas y costras en la parte del ganglio afectado, siendo el más frecuente el zóster de la zona del tórax.	La erupción provocada por la varicela aparece entre los 10 y 21 días posteriores a la exposición al virus de la varicela-zóster. La erupción suele durar entre 5 a 10 días. Fiebre. Pérdida del apetito. Dolor de cabeza. Cansancio y sensación de malestar general.	El virus varicela-zóster causa la varicela. Se puede propagar mediante el contacto directo con el sarpullido. También puede propagarse cuando una persona con varicela tose o estornuda y tú inhalas las gotas que se encuentran en el aire.	El riesgo de infección por el virus que causa la varicela es mayor si aún no tuviste varicela o si no recibiste la vacuna contra la varicela.	

## Infecciones Virales en la Piel del Adulto Mayor

Patología	¿Qué es?	Síntomas	Causa	Factores de Riesgo	Imagen
<p><b>Verrugas seborreica</b></p>	<p>son crecimientos en la piel que les salen a algunas personas a medida que envejecen. Son benignas, lo que significa que no son un tipo de cáncer. Su aspecto podría molestarle, pero no son dañinas.</p>	<p>La queratosis seborreica empeora progresivamente Una protuberancia cerosa o áspera de forma redonda u ovalada, Una protuberancia llana o levemente abultada de superficie escamosa, con un aspecto como si estuviera pegado a la piel El color varía de marrón claro a marrón o a negro Picazón</p>	<p>Las verrugas se transmiten por contacto directo, no a través de la sangre, porque el virus pasa de una persona a otra cuando hay pequeñas roturas o grietas en la piel o en las mucosas.</p>	<p>Es más frecuente desarrollar queratosis seborreica después de los 50 años. También es más probable que la desarrolles si tienes antecedentes familiares de la afección.</p>	
<p><b>Enfermedad de manos, pies y boca</b></p>	<p>La enfermedad de manos, pies y boca es una infección viral leve y contagiosa</p>	<p>Fiebre. Dolor de garganta. Náuseas. Lesiones dolorosas similares a ampollas en la lengua, las encías y la cara interna de las mejillas. Sarpullido en las palmas de las manos, las plantas de los pies y los glúteos.</p>	<p>La causa más frecuente de la enfermedad de manos, pies y boca es la infección por el virus de Coxsackie 16. Este virus de Coxsackie pertenece al grupo de los enterovirus no polio.</p>	<p>La edad es el principal factor de riesgo de la enfermedad de manos, pies y boca.</p>	

## Infecciones Fúngicas en la Piel del Adulto Mayor

Patología	¿Qué es?	Síntomas	Causa	Factores de Riesgo	Imagen
<b>Tiña</b>	La tiña del cuerpo (tinea corporis) es una erupción cutánea causada por una infección micótica. Por lo general, es un sarpullido circular y que pica, con piel más clara en el medio.	Un área escamosa en forma de anillo, normalmente en los glúteos, el tronco, los brazos y las piernas Picazón Un área clara o escamosa dentro del anillo Un parche de piel redondo y plano que pica Anillos superpuestos	La tiña es una infección fúngica contagiosa causada por parásitos comunes similares al moho que viven en las células de la capa externa de la piel.	clima cálido Tienes contacto cercano con una persona o animal infectado Compartes ropa, ropa de cama o toallas con alguien con una infección por hongos ropa apretada o restrictiva Tienes un sistema inmunitario débil	
<b>Onicomicosis</b>	Es una infección crónica por hongos que puede afectar la lámina ungueal de las uñas	No produce apenas síntomas, puede ocurrir que cuando la persona pida ayuda la infección se haya extendido y cause daños más graves, hay ocasiones en refieren que son muy dolorosas.	suele estar producirla por dermatofitos, mohos y levaduras, siendo los primeros los más frecuentes de los tres.	El no secar los pies y las uñas el tener uñas largas y sucias compartir calzado.	
<b>Candidiasis Oral</b>	un hongo que se encuentra en situaciones normales en el revestimiento de la boca. puede provocar un desequilibrio, cuando eso ocurre, prolifera en exceso	Placas blancuzcas en el interior de las mejillas y en la lengua. Molestias en la faringe, principalmente a la hora de tragar. Sangrado de encías Pérdida del sentido del gusto	Mala o pobre higiene dental. Pobre nutrición. Ingesta excesiva de determinados antibióticos, ya que éstos pueden destruir la flora bacteriana, Otras enfermedades bucales	es muy frecuente que las personas mayores tengan una dentadura postiza, por lo que una correcta higiene de la misma es esencial.	

## Otras Infecciones en la Piel del Adulto Mayor

Patología	¿Qué es?	Síntomas	Causa	Factores de Riesgo	Imagen
<b>Alopecia Areata.</b>	Enfermedad que afecta los folículos pilosos. Estos son áreas en la piel que dan crecimiento al pelo.	La pérdida de cabello generalmente es el único síntoma. Algunas personas también pueden sentir una sensación de ardor o de picazón.	Esto ocurre cuando el sistema inmunitario ataca y destruye por error los folículos pilosos sanos. Algunas personas con esta afección tienen antecedentes familiares de alopecia.	La alopecia areata puede comenzar a cualquier edad y afectar a cualquier grupo étnico.	 <p>The image shows an elderly person's head with significant hair loss on the top, characteristic of alopecia areata. There are also smaller patches of hair loss on the hands.</p>
<b>Cáncer de Piel</b>	El cáncer de piel es una enfermedad que afecta a personas de todas las edades, pero las personas mayores tienen un mayor riesgo debido a la acumulación de exposición solar a lo largo de sus vidas.	la aparición de pigmentaciones en la piel. Debemos revisar cuidadosamente, sobre todo, las zonas expuestas, como la cara, el cuello, cabeza y manos para detectar posibles anomalías.	exposición a los rayos del sol. exponerse a otras fuentes de luz ultravioleta. Las quemaduras solares aumentan el riesgo de sufrir cáncer de piel.	La mayoría de los cánceres de piel se detectan en personas mayores de 65 años.	 <p>The image shows a close-up of an elderly person's face with a large, dark, irregularly shaped mole or skin lesion, which is a common sign of skin cancer.</p>

## REFERENCIA BIBLIOGRÁFICA

1. Healthline. (s.f.). Obtenido de <https://www.healthline.com/health/es/infeccion-en-la-piel#fotos>
2. MANUAL MSD. (s.f.). Obtenido de <https://www.msdmanuals.com/es/professional/enfermedades-infecciosas/micobacterias/lepra>
3. MAYO CLINIC. (s.f.). Obtenido de <https://www.mayoclinic.org/es/diseases-conditions/cellulitis/symptoms-causes/syc-20370762>
4. Medicine Plus. (s.f.). Obtenido de <https://medlineplus.gov/spanish/ency/article/000860.htm>
5. MedlinePlus. (s.f.). Obtenido de <https://medlineplus.gov/spanish/ency/article/004014.htm>
6. MedlinePlus . (s.f.). Obtenido de <https://medlineplus.gov/spanish/ency/article/001450.htm>
7. NIH. (s.f.). Obtenido de <https://www.niams.nih.gov/es/informacion-de-salud/alopecia-areata>