



SUPER NOTA

Nombre del Alumno: Miguel de Jesús Vázquez Velázquez

Nombre del tema: obstrucción de vías aéreas, apendicitis, abortos.

Parcial : 1

Nombre de la Materia : Prácticas Profesionales

Nombre del profesor : Mariano Walberto Balcázar Velazco

Nombre de la Licenciatura : Licenciatura en Enfermería

Cuatrimestre : 9no

Fecha y lugar de elaboración
12/07/2024 Pichucalco Chiapas

Obstrucción de las vías respiratorias altas

Causas
Las vías respiratorias pueden estrecharse o bloquearse debido a muchas causas como:

- Reacciones alérgicas
- Reacciones y quemaduras químicas
- Epiglotitis
- Ataque de asma grave
- Cáncer de garganta
- Traqueomalacia

Expectativas (pronóstico)

El tratamiento oportuno a menudo es eficaz. Sin embargo, esta situación es peligrosa y puede ser mortal, incluso si se recibe tratamiento.

Esto se produce cuando las vías respiratorias altas se estrechan o bloquean, dificultando la respiración. Las zonas de las vías respiratorias superiores que pueden resultar afectadas son la tráquea, la laringe o la garganta (faringe).

Síntomas
Los síntomas varían, dependiendo de la causa. Pero algunos son comunes en todos los tipos de obstrucción de las vías respiratorias. Estos incluyen:

- Agitación o inquietud
- Coloración azulada de la piel (cianosis)
- Cambios del estado de conciencia
- Asfixia
- Confusión
- Dificultad para respirar,

Prevención

La prevención depende de la causa de la obstrucción de las vías respiratorias altas.

- Comer lentamente y masticar el alimento por completo.
- No beber demasiado alcohol antes o mientras esté comiendo.
- Mantener los objetos pequeños fuera del alcance de niños pequeños.
- Verificar que las dentaduras postizas encajen adecuadamente.

Posibles complicaciones

Si la obstrucción no se alivia, puede ocasionar:

- Daño cerebral
- Insuficiencia respiratoria
- Muerte

Tratamiento

El tratamiento depende de la causa de la obstrucción.

- Los objetos atorados en las vías respiratorias se pueden extraer con instrumentos especiales.
- Se puede insertar una sonda dentro de la vía respiratoria (sonda endotraqueal) para ayudar con la respiración





Es una inflamación del apéndice. El apéndice es una bolsa en forma de dedo que sobresale del colon en la parte inferior derecha del vientre, también llamada abdomen.

Apendicitis


Tratamiento
La mayoría de las veces, un cirujano extirpará el apéndice tan pronto como se realice el diagnóstico.

Si una tomografía computarizada muestra que usted tiene un absceso, lo pueden tratar primero con antibióticos. A usted le extirparán el apéndice después de que la infección y la inflamación hayan desaparecido.



Síntomas
Los síntomas de la apendicitis pueden incluir:

- Dolor repentino que comienza en el lado derecho en la parte inferior del abdomen.
- Dolor repentino que comienza alrededor del ombligo y a menudo se desplaza a la parte inferior derecha del abdomen.



Causas
La apendicitis es una razón muy común de cirugía de emergencia. El problema casi siempre ocurre cuando el apéndice resulta bloqueado por heces, un cuerpo extraño, un tumor o, en ocasiones poco frecuentes, un parásito.



Aborto

Aborto espontáneo:

El aborto espontáneo es aquel que no se da de forma intencionada, sino a causa de una serie de complicaciones en el feto o en la madre

El **aborto** es la pérdida del embarazo "en un momento en el que el feto o embrión no es viable, es decir, que no es capaz de sobrevivir fuera del útero materno"

Aborto quirúrgico

Se realiza una cirugía para extraer el feto. Existen dos métodos frecuentes de aborto quirúrgico por aspiración con vacío manual, que se puede hacer durante las 12 primeras semanas de embarazo y consiste en la extracción de todo el tejido que contiene el útero con un instrumento succionador de manera manual y la dilatación y evacuación

Se puede producir tanto de forma espontánea como inducida. En este último caso, la ley española permite la interrupción voluntaria y libre del embarazo hasta la semana 14 de gestación.

Muerte fetal

Cuando el aborto ocurre con posterioridad a las 20 primeras semanas de gestación se conoce como muerte fetal y en estos casos siempre se requiere de cirugía para extraer el feto del útero.

Aborto inducido

El aborto inducido es aquel que se realiza por propia voluntad de la mujer.

Diferencias entre píldora del día después y píldora abortiva

Existe la creencia de que la píldora del día después es abortiva y perjudicial para la mujer o para su capacidad reproductiva futura. La píldora del día después no puede interrumpir un embarazo en curso ni dañar un embrión en desarrollo.

Aborto médico

Se toma un medicamento para llevar a cabo el aborto. Sólo se puede hacer durante las nueve primeras semanas de embarazo.

Bibliografía

<https://cuidateplus.marca.com/reproduccion/embarazo/diccionario/aborto.html>

<https://medlineplus.gov/spanish/ency/article/000256.htm>

<https://medlineplus.gov/spanish/ency/article/000067.htm>