



SUPER NOTA

Nombre del Alumno: Jose Gustavo Bastar
Lopez

Nombre del tema: intervenciones de
enfermeria

Parcial:1ro

Nombre de la Materia: practicas
profesionales

Nombre del profesor: Mariano Walberto
Balcazar Velazco

Nombre de la Licenciatura: ENFERMERIA

Cuatrimestre: 9no

Fecha: 13 de julio del 2024

Intervenciones de enfermería en pacientes con obstrucción de vías aéreas

La obstrucción de las vías aéreas se produce cuando algo impide que el aire entre en las vías aéreas de los pulmones y salga de ella.

Intervenciones de enfermería:

- 1.- Control y valoración de FC, PA, Sat.O2, 1°.
- 2.- Valorar el estado de la respiración y ventilación.
- 3.- administrar oxígeno si la SatO2 es menor de 90%; taquipnea; esfuerzo respiratorio, así evitar hipoxia tisular.
- 4.- colocar al paciente en posición sentada o fowler alta.
- 5.- aflojar la ropa, disminuir la movilidad para evitar demandas de oxígeno.
- 6.- valorar el nivel de conciencia.
- 7.- valorar signos de hipoperfusión cutánea.
- 8.- valorar signos de hipoperfusión tisular.
- 9.- acceso venoso periférico para administración de medicamentos (corticoide indicado, esteroides indicados)
- 10.- nebulizaciones
- 11.- aspiración de vías aéreas
- 12.- evaluar la respuesta a la terapia indicada.
- 13.- preparación de equipo para soporte ventilatorio invasivo.



Las causas incluyen:
Obstrucción del apéndice por materia fecal, cuerpo extraño, nematodos o infección por lombrices intestinales
Infección viral
Infección por bacterias como E.coli, Enterococco, Streptococco, Clostridium
Antecedentes familiares: el 30% de la apendicitis en niños tiene antecedentes familiares



Intervenciones de enfermería en pacientes con apendicitis

La apendicitis ocurre cuando se bloquea la apertura del apéndice o debido a una infección.

Intervenciones de enfermería:
La enfermera prepara al paciente para la cirugía.

Infusión intravenosa. Se realiza una infusión intravenosa para reemplazar la pérdida de líquidos y promover el funcionamiento renal adecuado.
Terapia con antibióticos. Se administra terapia con antibióticos para prevenir infecciones.

Posicionamiento. Después de la cirugía, la enfermera coloca al paciente en una posición de alto vuelo para reducir la tensión en la incisión y los órganos abdominales, reduciendo así el dolor.

Fluidos orales. Cuando se tolera, se pueden administrar líquidos por vía oral.



Aborto espontáneo:

- 1) Valoración de la pérdida hemática, cantidad y posible aparición de coágulos y tejido fetal.
- 2) Control de pulso, temperatura, tensión arterial, respiraciones.
- 3) Alivio del dolor.
- 4) Determinación del grupo sanguíneo y factor RH.
- 5) Administración de oxitócicos.
- 6) Ofrecer información objetiva sobre la evolución del proceso.
- 7) Enseñar las medidas que favorecen el autocuidado.
- 8) Ofrecer apoyo emocional a la mujer y su pareja.

Aborto séptico:

- Evaluar signos vitales.
- Administración de antibióticos intravenosos según prescripción médica.
- Monitoreo constante de signos vitales y manejo de posibles signos de choque.
- Preparar a la paciente para un posible procedimiento quirúrgico de evacuación del útero.
- Informar a la paciente y a su familia la gravedad de la situación, el plan de tratamiento y la importancia del seguimiento médico.

Intervenciones de enfermería en pacientes con abortos

Aborto provocado:

- Cuidados personales: recomendarle al paciente que descanse, evite actividades extenuantes y aeróbicas, y use toallas sanitarias para el sangrado.
- Monitoreo: vigilar signos vitales de la paciente para minimizar la gravedad de las complicaciones.
- Potenciación de la autoestima: observar las afirmaciones del paciente sobre su autovalía.
- Acogida, cuidado, educación y seguimiento: darle buen trato al paciente, darle apoyo emocional y monitorear su avance de recuperación.



Aborto incompleto:

- evaluar el estado de la paciente, verificar los signos vitales y el grado de sangrado.
- Preparar a la paciente para un procedimiento de evacuación uterina si es necesario.
- Monitorear signos vitales, controlar el sangrado y proporcionar apoyo emocional.
- Informar a la paciente sobre los cuidados en el hogar y signos de complicaciones que requieren atención médica inmediata.

Bibliografía:

<https://es.slideshare.net/slideshow/enfermeria-obstruccion-via-aerea-/6404253>

[Apendicitis - Enfermería Virtual
\(enfermeriavirtual.com\)](http://enfermeriavirtual.com)

[El aborto espontáneo, complicaciones y
actividades enfermeras \(revista-
portalesmedicos.com\)](http://portalesmedicos.com)