



Magdiel Sebastián Pérez verdugo

Lic.niuzet Adriana Cruz Paez

Universidad del sureste

Farmacología

Licenciatura en enfermería

Tapachula, Chiapas

01 de agosto 2024

BRONCODILATADORES ANTITUSIVO Y EXPECTORANTE

BRONCADILADORES

Tipo de medicamento que abre las vías respiratorias pequeñas de los pulmones

CUÁNDO USAR UN BRONCODILATADOR

Afecciones como el asma y la enfermedad pulmonar obstructiva crónica (EPOC) que causan dificultades respiratorias

CUÁL ES EL MEJOR BRONCODILATADOR

Albuterol (ProAir HFA, Proventil HFA, Ventolin HFA)
Levalbuterol (Xopenex HFA)
Metaproterenol.
Terbutalina.



CUANTO TIEMPO USA BRONCODILATADORES

Treinta minutos después de realizar la prueba con la administración de Salbutamol se evaluará el nivel de esfuerzo respiratorio que presenta el niño.

EN QUÉ CONSISTE LA PRUEBA CON LOS BRONCODILATADORES

La prueba con broncodilatadores consiste en realizar tres series de 2 disparos con aerocámara separadas por 20 minutos.

ANTITUSIVO

QUE ES UN ANTITUSIVO

antitusígeno o antitusivo es un medicamento empleado para tratar la tos seca irritativa, no productiva

El primero se recomienda para suprimir la tos seca o improductiva, y el segundo para ayudar a eliminar el exceso de mucosidad del árbol bronquial



EJEMPLOS

codeína,
dextrometorfano,
dimemorfano, y
cloperastina.

Bisolvon Jarabe
Antitusivo y Bisolvon
Antitusivo Compositum

EXPECTORANTES



PARA QUE SIRVE

son sustancias capaces de incrementar el volumen de las secreciones bronquiales o de estimular los mecanismos para su eliminación, por expulsión o deglución



CUAL ES MEJOR EXPECTORANTE

los derivados tiólicos (como acetilcisteína) y los derivados de vasicina (como ambroxol y bromhexina)



CUÁNDO TOMAR UN EXPECTORANTE

si tiene una tos que produce mucosidad espesa y está teniendo dificultades para expulsarla



QUE ALIVIA EL EXPECTORANTE

diluir la mucosidad de las vías respiratorias para facilitar la expectoración de la mucosidad y despejar las vías respiratorias.



CÓMO SE LLAMA EL JARABE EXPECTORANTE

Bisolvon
Expectorante



CUANTO TARDA PARA SER EFECTO

inician su acción después de 20 o 30 minutos de tomar la dosis indicada