

UDS

CAMPUS , TAPACHULA

NUTRICIÓN

PRACTICAS EN NUTRICIÓN CLÍNICA II

CUADRO SINÓPTICO

3ER PARCIAL

ANTONIO CABRERA RAMIREZ

Desnutrición



Conjunto de alteraciones clínica y metabólicas que tienen en común el origen, en un balance energético o proteico negativo que lleva al agotamiento



Según su intensidad

Primaria

Sucede por la disminución prolongada de aporte calórico proteico, con alteraciones de la estructura y funciones del organismo.

Secundaria

Se manifiesta como consecuencia de una patología existente

Falla de ingesta, digestión, absorción, metabolismo y pérdida excesiva de nutrientes

Mixta

Es de origen primario y es agravada por factores o elementos del medio exterior o del propio organismo e injurias que se dé a un paciente.

Según su etiología

Leve

Perdida del 10 al 25%

Moderada

Perdida del 25-40%

Severa

Perdida mayor al 40%

Marasmo

Calórica, cabeza grande en relación al cuerpo "cara de viejito", pliegues sueltos, abdomen plano, conducta irritable, piel delgada y seca, cabellos finos se arrancan con facilidad.

Mixta

Kwashiorkor

Proteica aguda, cara edematizada "cara de luna llena" abdomen y asas distendidas, hepatomegalia, conducta indiferente, dermatosis, cabello hipopigmentado.