



Lic.Medicina veterinaria y zootecnia

6to cuatrimestre

Jorge Alfredo Pérez Rodríguez

“Zootecnia de bovinos”

M.V.Z.Roman Reyes Velázquez Cancino

Tapachula chiapas a 04 de julio del 2024.



FASES DEL PARTO

DILATACION DEL CERVIX

La primera etapa dura de 2 a 3 horas en vacas adultas y de 4 a 6 horas en vaquillonas. El cuello uterino se dilata por acción de una hormona llamada oxitocina, y por la presión de la "bolsa de agua"

En la segunda etapa el ternero avanza por el canal de parto ayudado por las contracciones uterinas.



NACIMIENTO DEL TERNERO

Es importante tener presente que esta etapa puede demorar de 2 a 10 horas y no siempre es bueno apurarse en "ayudar". En la última etapa la placenta es expulsada del útero.

Luego del nacimiento del ternero, las contracciones uterinas continúan ayudando a romper los cotiledones, separando la placenta de las carúnculas uterinas; son los puntos de unión entre las partes materna y fetal que contribuyen a la nutrición

EXPULSION DE LA PLACENTA

La placenta debe ser expulsada dentro de las 12 y hasta las 24 horas del nacimiento. La retención de placenta se ve en mayor medida en partos prematuros o difíciles y también en infecciones bacterianas.

La placenta no debe removerse de forma forzada, ya que podemos ocasionar lesiones en el útero y esterilidad permanente. La prevención consiste en una correcta sanidad durante el parto, y una adecuada nutrición durante el período seco.