



UNIVERSIDAD DEL SURESTE
CAMPUS TAPACHULA




LICENCIATURA EN MEDICINA VETERINARIA Y ZOOTECNIA
6° CUATRIMESTRE


NOMBRE DEL ALUMNO:
KEREN CECILIA MÉNDEZ MORENO

ZOOTECNIA DE BOVINOS

NOMBRE DEL DOCENTE:
Román Reyes Vásquez Cancino



FASES DEL PARTO EN BOVINOS



≡ CONCEPTOS

DILATACIÓN DE CERVIX

NACIMIENTO DEL TERNERO

EXPULSIÓN DE LA PLACENTA

PARTO DISTÓCICO

DEFINICIÓN ≡

En general, esta etapa dura de dos a tres horas en la vaca adulta y cuatro a seis en novillas. Durante esta etapa, el cervix se dilata debido a una liberación de hormona (oxitocina) y la presión de la "bolsa de agua". Por lo tanto, una ruptura temprana de la "bolsa de agua" puede llegar a demorar la dilatación del cervix.

El ternero puede encontrarse aún en la segunda "bolsa de agua". Luego de que la cabeza ha pasado el canal del parto, el resto del cuerpo demanda menor esfuerzo extra para ser expulsado. Esta etapa puede durar de dos a 10 horas. Un error común es intentar asistir tirando las patas anteriores del ternero demasiado temprano.

La placenta es expulsada del útero. Luego del nacimiento del ternero, las contracciones uterinas se continúan por un período de tiempo y ayudan a romper los cotiledones separando la placenta de las carúnculas uterinas. Normalmente, la placenta debe de ser expulsada dentro de las 12 horas del nacimiento.

Las patas delanteras del ternero deben de aparecer. Si existen signos de cansancio, se debe de proveer asistencia es muy importante lavar y desinfectar manos, brazos, la vulva de la vaca y todo el equipo que será utilizado durante la asistencia. La posición del ternero debe ser determinada primero y, si es necesario, corregida antes de hacer tracción. La tracción debe ser aplicada a medida que la vaca puja.

