



## **Universidad del sureste**

Lic. Medicina Veterinaria y Zootecnia

**6to Cuatrimestre Grupo B**

Asignatura:

**Zootecnia de aves**

Docente:

**M.v.z Ety Josefina Arreola Rodriguez**

Tema:

**Reproducción en aves de corral (Mapa conceptual)**

Alumno:

**Margarita Concepción Martínez Trujillo**

Fecha:

**Sábado 25 de Mayo del 2024**

# Reproducción de aves de corral

## Definición

Las aves se reproducen sexualmente, tienen sexos separados y presentan fertilización interna, por lo tanto, machos y hembras deben aparearse para que la reproducción ocurra. El apareamiento generalmente es precedido por un cortejo. En la mayoría de las especies los padres cuidan a los huevos y su eclosión

Razas

## Pollos

### Cortejo

El macho baja un ala y baila en círculo (el ala más baja va a estar en la parte interna de la danza en círculo).

La gallina se agazapa (agacha la cabeza y el cuerpo) para indicar que está lista para recibir al macho.

Razas

## Gansos

### Cortejo

Generalmente se reproduce por primera vez a los 3 años

El ganso realiza un cortejo muy romántico a la hembra. Primero la corteja a distancia, se mantiene erguido y sumerge de vez en cuando el cuello en el agua. Parece ser precavido al cortejar a la hembra, por el peligro que corre de ser atacado por los gansos pertenecientes al grupo de la hembra, por lo general, el macho escoge a una hembra de diferente grupo. Con su actitud el ganso busca convencer a la hembra para que lo siga. Cuando la logra, se convierten en pareja.

Razas

## Pavos

### Cortejo

La temporada de reproducción de los pavos salvajes suele ocurrir a finales de la primavera y principios del verano, desde mediados de marzo hasta junio. En este punto, los machos comienzan a centrarse básicamente en nada más que el sexo. Pasan sus días enteros exhibiéndose, lo que para un pavo significa estar de pie con las plumas de la cola desplegadas en abanico, las alas arrastradas por el suelo, sus carnosas barbas (en el cuello y la garganta) y la redecilla (sobre el pico) hinchadas y de color rojo brillante, o, como los llamamos en otro artículo, "erecciones faciales", y emiten ruidos muy fuertes de engullir.

Razas

## Patos

### Cortejo

Los machos menean o giran la cabeza de lado a lado, miran sobre sus hombros, o se levantan sobre el agua aleteando con las alas extendidas. Es común que varios machos a la vez rodeen a una hembra para cortejarla

## Reproducción

El apareamiento completo se da cuando el gallo mete la cola al lado de la cola de la gallina y abre las plumas de la cola para que entren en contacto las cloacas. En este momento el semen del gallo se libera directamente en la vagina de la gallina a través de la cloaca.

## Fertilidad

Con el apareamiento natural, va a haber como resultado una mejor fertilidad cuando se da el apareamiento después de que la gallina ha puesto un huevo con cascarón. Sin embargo, si las gallinas se aparean con frecuencia (a diario), es poco probable que se note la diferencia en la fertilidad independientemente de cuando suceda el apareamiento.

## Reproducción

- El macho insinúa montar a la hembra
- Ambos se sujetan con el pico a las plumas del cuello
- El macho decide montar a la hembra
- La hembra se queda quieta para que el macho la monte
- Después de la monta la hembra se refresca sumergiendo la cabeza en agua
- El macho abre las alas en señal de triunfo

## Fertilidad

La puesta consta de entre 4 y 7 huevos de color blanco, frecuentemente manchados, que son incubados en solitario por la hembra durante unas cuatro semanas.

## Reproducción

Un pavo macho se pavoneará (el macho dominante elige primero) y si una hembra está interesada, la pareja hará un pequeño baile en el que se rodearán. Es extraordinariamente algo digno. Al final, el macho se para literalmente encima de la hembra antes de comenzar el coito, que dura menos de un minuto, aunque a veces la pareja se aparean varios veces.

## Fertilidad

Los pavos son polígamos y un macho puede fertilizar hasta 10 gallinas. Esto resulta útil cuando hablamos de pavos domesticados.

## Fertilidad

La hembra pone alrededor de 8 a 15 huevos, cuya incubación dura 30 días. Cuando las crías nacen, la madre los llama desde el suelo y estas se lanzan en caída libre

# BIBLIOGRAFÍA

- <https://animalandia.educa.madrid.org/ficha.php?id=1143#:~:text=En%20la%20%C3%A9poca%20de%20reproducci%C3%B3n,hembra%20durante%20unas%20cuatro%20semanas.>
- <https://www.elsitioavicola.com/articles/1784/apareamiento-y-reproduccion-natural/#:~:text=El%20apareamiento%20completo%20se%20da,a%20trav%C3%A9s%20de%20la%20cloaca.>
- <https://modernfarmer.com/2016/11/everything-want-know-turkey-sex/>
- <https://cadenaser.com/nacional/2023/04/21/por-que-el-pene-de-los-patos-es-desproporcionado-y-tiene-forma-de-sacacorchos-cadena-ser/>
- <https://www.zoologicoelbosque.com/pato-criollo-cairina-moschata/>
- <https://celebrateurbanbirds.org/es/learn/birds/focal-species/mallard-2/#:~:text=Durante%20el%20cortejo%20%20los%20machos,a%20una%20hembra%20para%20cortearla>