

MEDICINA VETERINARIA Y ZOOTECNIA

**CUADRO SINÓPTICO UNIDAD IV. ZOOTECNIA DE
AVES**

MVZ. ROBERTO SEDANO BARREDA

VICTOR HUGO BALBOA CASTILLO

30 DE JULIO DE 2024

VACUNAS EN AVES


NEW CASTLE

Vacuna liofilizada de virus activo modificado para la inmunización contra la enfermedad de Newcastle. Indicada para aplicarse en aves jóvenes de reposición, pollo de engorda, gallinas, tórtolas y gallos de pelea.

DOSIS Y ADMINISTRACIÓN

Primera semana de edad.

- Vía ocular o nasal: 1 gota por ave.
- Vía oral en agua de bebida: 25 dosis (1.3 mL) en 250 mL de agua por cada 25 aves.



TRIPLE AVIAR

es una vacuna que está indicada para la prevención de la enfermedad de Newcastle y cólera aviar. Para la prevención de las enfermedades del Newcastle, bronquitis infecciosa y Gumboro.

DOSIS Y ADMINISTRACIÓN

- Aves de 10 días a 1 mes: 0.5 mL.
- Aves de más de un mes: 1 mL.
- Refuerzo a los 21 días de edad.
- Vía de administración: Intramuscular.



MAREK

Vacuna a virus activo de la enfermedad de Marek cepa CVI988 asociada a células en una suspensión conteniendo virus y fibroblastos de embrión de pollo SPF. La vacuna contiene estabilizadores y antibióticos. Como ayuda en la prevención de los signos y lesiones asociados con la enfermedad virulenta de Marek.

DOSIS Y ADMINISTRACIÓN

- Dosis: 0.2 ml por ave.
- Vacunar solo a pollos sanos de un día de edad.
- Vía de administración: Subcutanea



CORIZA

es una vacuna en suspensión inactivada con adyuvante de hidróxido de aluminio. Se recomienda para la Inmunización activa en aves contra la Coriza Infecciosa, provocada por Avibacterium paragallinarum (Serotipos A, B y C) y contra infecciones causadas por Salmonella enteritidis.

se recomienda para la inmunización activa de lotes de aves de postura y reproductoras entre 8-12 semanas de edad, contra la Coriza Infecciosa causada por Avibacterium paragallinarum y contra infecciones causadas por Salmonella enteritidis. Se debe revacunar 4 a 6 semanas después de la primera aplicación.

DOSIS Y ADMINISTRACIÓN

- La vacuna se puede aplicar por vía subcutánea o intramuscular a una dosis de 0.5 ml por ave:
- Subcutánea, en la piel laxa de la parte dorsal del tercio medio del cuello.
- Intramuscular, en la pechuga.

BIBLIOGRAFÍA

- <https://www.ceva.com.mx/Especies-y-Productos/Listado-de-Productos/CEVAC-R-CORYMUNE-4K#:~:text=CEVAC%C2%AE%20CORYMUNE%204K%20es,infecciones%20causadas%20por%20Salmonella%20enteritidis.>
- <https://www.zoetis.mx/products/avicola/md-vac-cfl.aspx>
- <https://biozoo.com.mx/mx/productos/vacuna-triple-aviar-pm>
- <https://biozoo.com.mx/mx/productos/vacuna-contrala-enfermedad-de-newcastle>