



Lic. Medicina veterinaria y zootecnia

Sexto Cuatrimestre

Alexis Hair Hernández Barrios

“zootecnia de porcinos”

M.v.z: Roberto García Sedano Barreda

Tapachula, chiapas

MANEJO DE LECHON

LECHON



Cortar los colmillos también es muy importante ya que esto evitará posibles lesiones a causa de peleas al tratar de establecer el pezón definitivo. cólico en los caballos.

Dentro de las granjas porcinas el lechón recién nacido es una prioridad, debido a que en esta fase se presenta una alta mortalidad debido a las condiciones de manejo y a las enfermedades. Un buen manejo al momento del nacimiento, permitir que tomen calostro durante las primeras horas de vida y evitar que el ombligo se infecte son factores determinantes que asegurarán la supervivencia y desempeño productivo en las fases productivas siguientes.



La aplicación de hierro en lechones es muy importante debido a que el lechón en la actualidad presenta una serie de características de alto desempeño productivo como: mayores ganancias de peso, una alta tasa de crecimiento, una mejor conversión alimenticia, lo que se traduce en un menor tiempo para ofrecer animales al mercado y una mayor rentabilidad, por lo que es de suma importancia cubrir todos los requerimientos nutricionales que tenga el animal y así poder satisfacer la demanda que presentan los lechones recién nacidos.

El parto de una cerda puede durar de tres a tres horas y media, un tiempo aproximado de 15 minutos entre cada lechón. Durante el parto se debe asistir a la cerda tomando medidas sanitarias como lavado y desinfección de las manos, y el uso de guantes estériles.

La sala de maternidad, se debe limpiar y desinfectar 15 días antes del parto. Si sala tiene paredes y piso en concreto, se debe usar para su lavado detergentes y desinfectantes. La cerda se debe llevar entre 8 – 10 días antes de la fecha programada de parto a la sala de maternidad y se le debe proporcionar una cama seca y limpia.

Lo primero que se debe hacer es asegurarse de que cada lechón al nacer respire. Para esto se puede estimular a los lechones secándolos utilizando una toalla o trapo, priorizando la boca y las fosas nasales, que estarán cubiertas con mucosa y membrana placentaria.



El corte de colmillo se debe realizar en las primeras 6 horas, posteriores a mamar tres o cuatro veces el calostro de la madre. En este momento los lechones ya han adquirido inmunidad por el consumir el calostro.

En el segundo o tercer día de vida del lechón se aplica de hierro dextrano, se cortan las colas y se identifican los lechones por medio muescas o cualquier otro método.

La castración se realiza en los primeros 10 días.



BIBLIOGRAFIA

<https://zoovetesmipasion.com/porcicultura/suministro-de-hierro-en-lechones>
<https://zoovetesmipasion.com/porcicultura/manejo-del-lechon-recien-nacido>