

Nombre: Eduardo Avendaño Moreno

Asignatura: Zootecnia de cerdos

Tema: Instalaciones de cerdos

Docente: Roberto Sedano

Cuatrimestre: 6to Cuatrimestre

Monta

El lugar destinado a los cerdos, debe ser alto, soleado, seco, aireado, con buen declive para permitir el rápido drenaje del agua, suelo permeable y fértil. Los comederos circulares son los más utilizados para lechones, los de varias bocas en transición y el tipo holandés (boca única) en crecimiento y engorde. Los bebederos suelen ser tipo "chupete", "cazoleta" o "bañera"

Gestación

El alojamiento puede estar diferenciado en dos espacios uno para las cerdas desde el destete hasta finalizar el primer mes de gestación, una vez constatado el diagnóstico de gestación positivo, (nave de cubrición-control, 4-6 semanas) y otro para el resto de la gestación (nave de gestación confirmada, 11-12 semanas)

Maternidad

Está compuesta por un conjunto de salas de capacidad variable (entre 6 y más de 20 plazas) dispuestas, generalmente, en forma de "vagón de tren". La estructuración en salas obedece a la conveniencia de realizar "todo dentro todo fuera" para limpiar y desinfectar la instalación e intentar realizar vaciado sanitario entre dos grupos consecutivos de cerdas.

Destete

Suelen estar acondicionadas, con ventilación dinámica y calefacción, generalmente de tipo ambiental. Los lechones se alojan en grupos a una densidad legal de 4-5 lechones/m² (0.20-0.25 m² /lechón), disponen de comedero y bebedero y el suelo puede ser parcial o mejor totalmente emparrillado y a poder ser de plástico. El coste comercial de implantación es de alrededor de 120-140 Eu por plaza.

Publicidad

Crecimiento y engorde

En caso de granjas en climas húmedos, existen algunas diferencias que se pueden observar en las figuras 7 y 8. Cada nave puede o no estar dividida en salas y cada sala se compone de un número variable de corrales según sea el tamaño del grupo. Las particiones entre corrales suelen ser de hormigón o metal. El tamaño de grupo más habitual varía entre diez y más de 30 cerdos. El suelo suele ser de hormigón ya sea total o parcialmente emparrillado.

Referencias

[01-BuenasPracticasCap1.pdf \(produccion-animal.com.ar\)](#)