

UNIVERSIDAD DEL SURESTE



Alumna: Priscila A. Muñoz de Leon
Licenciatura: Medicina veterinaria y zootecnia.
Materia: Produccion sustentable de leche.
Actividad:.. Supernota

Docente: Mvz M^o de Lourdes Dominguez Figueroa

 @UDS_universidad

www.uds.mx

Mi Universidad


Tel. 01 800 837 86



Las buenas PRACTICAS PECUARIAS de la ordeña

Antes de ordeñar

- Revise si el lugar de ordeño está limpio y listo para recibir a las vacas;
- Ordénelas siempre a la misma hora;
- Lleve las vacas al lugar de ordeño con calma, sin golpearlas y sin correr ni gritar.
- Respete la secuencia de ordeño: ordeñe primero las vacas sanas y deje las vacas con problemas para el final;
- Acomode las vacas en el área de ordeño sin gritarles, empujarlas o golpearlas para que se coloquen en su lugar.



Durante la ordeña

El primer paso de la ordeña debe ser el lavado de la estructura del pezón. Si hay una ordeña con ternero debe permitirsele mamar para estimular la bajada de leche y luego volver a realizar el lavado (pre-dipping) y esperar a que se seque.



Si alguna vaca defeca u orina durante el ordeño, use una escoba de goma o una pala y empuje (o saque) el estiércol hacia el conducto de drenaje. Lave el local solo en el intervalo entre un ordeño y otro.

Desinfecte los pezones (post-dipping)

Ordeño

El proceso de ordeño debe durar un tiempo no máximo a 5 minutos para poder aprovechar al máximo la bajada de la leche. En el proceso se utiliza movimientos suaves, delicados y continuos empezando siempre por los cuartos delanteros o en forma diagonal. Ordeñe hasta escurrir a la vaca por completo.



Selle con un producto yodado o clorado para proteger el pezón, ya que el esfínter queda abierto por varios minutos y pueden ingresar microorganismos que causan mastitis.

Al terminar de ordeñar debe procederse a desatar las patas y cola de la vaca con tranquilidad. Si el ordeño fue con ternero se permite que el mame.

Despues de la ordeña



Selle con un producto yodado o clorado para proteger el pezón, ya que el esfínter queda abierto por varios minutos y pueden ingresar microorganismos que causan mastitis. Desate patas y cola.

Vacíe la leche del balde a la cantina utilizando un embudo con un filtro desechable. Cambie el filtro desechable después de llenar cada cantina.

Bibliografía

https://redgatro.fmvz.unam.mx/assets/cursos/productores/curso_5/TEPAL%20BPP%20Leche.pdf

<https://www.casanare.gov.co/Dependencias/Agricultura/DocumentosCadenaCrnicos/Folleto%20sobre%20rutina%20de%20ordeno.pdf>

https://redgatro.fmvz.unam.mx/assets/cursos/productores/curso_5/TEPAL%20BPP%20Leche.pdf