Nombre de alumno: Luis Ángel López Méndez.

Nombre del profesor: Hugo Alexander Pérez.

Nombre del trabajo: Mapa Conceptuales.

Materia: Fisiología de la reproducción.

Grado: 3°

Grupo: A

Comitán de Domínguez Chiapas a 7 de julio del 2024

PARTO

Resolucion de distocia

- Es la manipulacion necesaria para corregir la presentacionposicion y actitud del feto que se presentan de manera anormal
  - Para hacer la mutacion es necesesario, que haya espacio dentro del utero
    - Repulsion; Consiste en empujar el feto hacia la cavidad uterina y puede ser manual o instrumental, con muletas o cadenas.
- Maniobras de obstreticas
  - mutacion
  - extraccion forzada fetotomia
  - TRaccion forzada; Este auxilio obstreticio esta indicado es cuando hay disturbio en el parto ofeto es grande
    - Fetotomia; Comprende todas las interversiones cruentas encaminadas a dsiminuri el volumen del feto dentro del cuerpo de la madre

Cervix

- Es un organo de paredes gruesas , que establece la conexionentre la vagina y el utero
  - La entrada del cervix esta proyectada hacia la vulva en forma de cono.
    - El cervix se abre hacia adelante del cuerpo uterino, como de una pulgada de largo
- Estructura cartilagosa de 3 anillos que sirve como punto de referencia en palpacion del aparato reproductor y sirve para conectar el utero con la vagina
  - En la gestacion se produce un gel viscoso que se conoce como tapon de warthom, esta impide el paso de germenes
    - Su interior de 3 o 4 anillos le facilita otra funcion, la de proteger el utero del medio ambiente, hay que tener en cuneta que el tamaño varia segun la edad.

Anomalias de cervix

- Una anomialia del cervix bifido tiene 2 conductos los cuales pueden ser o no funcionales
  - Los quistes se desarollan cuando ocurre una falta de ovulacion y los foiculos aumentan de tamañomas alla del diametro del ovulo
    - Tambien pueden darse por un transtorno de la secrecion LH
  - Enfermedad quistica ovarica bovins
    - se desrollan cuando ocurre una falla en la ovulacion y los foiculos aumnetan de tamañomas alla del diametro del ovulo y persisten interrumpiendo los ciclos estrales
    - Es uno de los principales enfermedades causantes de abortos

Funcion de la oxitoxina

- Oxitocina, Tambien se produce en el cuerpo luteo. tien 2 origenes; hipotalamo y ovario
  - Accion; Para ayudar al parto o la expulsion de placentas retenidas
    - Contractil sobre las fibras longitudinales del miometrio partiendo la expulsion del feto durante el parto y despues del parto
  - Relacionada con los patrones sexuales y con la concucta maternal, tambien actua como neurotransmisores en el cerebro
    - En hembras, la oxitocina se libera en grandes cantidades tras la distension del cervix uterino y la bagina durante el parto