Nombre de alumno: IVÁN DE JESÚS MORENO LÓPEZ

Nombre del profesor: HUGO ALEXANDER PÉREZ LÓPEZ

Nombre del trabajo: MAPA CONCEPTUAL

Materia: FISIOLOGÍA DE LA REPRODUCCIÓN

Grado: 3

Grupo: A

Comitán de Domínguez Chiapas a 16 de Junio de 2024

CICLOS ESTRALES

DE

VACA

DURACION

Aproximadamente 21 dias

FASES

5 fases

PROESTRO

*se prepara para es celo
*Incremento en el flujo sanguineo de los ovarios

ESTRO

*Receptividad ala monta
*Ocurre ovulacion

METAESRO

*Formacion del cuerpo luteo
*Finalizacion de la ovulacion

DIESTRO

1-15 dias.
Funcion uerpo luteo produccion de progesterona

anestro

Periodo de inactividad sexual, en algunas vacas, en estaciones adversas

YEGUA

DURACION

Aproximadamente 21 dias

FASES

5 Fases

PROESTRO

2-3 dias.
*Incremento en la actividad de los ovarios.
*Comienza el desarrollo folicular

ESTRO

5-7 dias
*Receptividad sexual
*Ocurre ovulacion generalmente 24-48 horas antes del final del estro

METAESTRO

2-3 Dias.
*Inicio de la formacion del cuerpo luteo

DIESTRO

14-15 dias.
Produccion de progesterona por el cuerpo luteo

ANESTRO

Periodo de inactividad sexual, generalmente en invierno

PORCINA

DURACION

Aproximadamente 21 dias

FASES

5 Fases

PROESTRO

*3-4 dias.
*Inicio del desarrollo folicular
*Comportamiento de busqueda del macho

ESTRO

*2-3 dias.
*Maxima receptividad sexual
*ocurre ovulacion hacia el final del estro

METAESTRO

*2-3 dias.
*Formacion del cuerpo luteo

DIESTRO

*14-16 Dias:
*Produccion de progesterona

ANESTRO

*Generalmente asociado a la lactacion y periodos de inactividad reproductiva

CANINA

DURACION

Aproximadamente 6-7 meses

FASES

4 fases

PROESTRO

*Hinchazon vulvar y sangrado
*Aumento del interes por los machos, reacgaza a la monta

ESTRO

*Receptividad sexual
*Ocurre ovulacion 2-3 dias despues del estro

DIESTRO

*Hinchazon vulvar y sangrado
*aumento del interes por los machos, rechazo a la monta

ANESTRO

*4-5 meses
*Inactividad sexual y preparacion para el proximo ciclo

FELINA

DURACION

Aptoximadamente 21 dias

FASES

4 fases

PROESTRO

1-2 dias
*Incremento enel comportamiento del celo .
*Aumento en el ronroneo las vocalizaciones

METAESTRO

* ocurre ovulacion sin fecundacion, dura alrededor de 14 dias
*desarrollo del cuerpo luteo

ANESTRO

4-5 meses
*Inactividad sexual y preparacion para el proximo ciclo