



**NOMBRE DE ALUMNO:**

Marco Antonio jimenez cruz

**MAESTRO**

Luis Miguel Sánchez

**MATERIA**

Psicopatología

**CUATRIMESTRE**

6to.

**CARRERA**

psicología



## Trastorno Bipolar y Relacionados y Trastornos Depresivos

Trastorno Bipolar I

Es una enfermedad mental que afecta a los mecanismos que regulan el estado de animo.

Episodio Maniaco

Afección del estado de animo que puede provocar cambios de animo intenso, en ocasiones puede sentirse extremadamente animado, eufórico, irritable o con alegría.

Episodio de Depresión Mayor

La depresión mayor, también llamada, unipolar o trastorno depresivo grave, se da cuando el paciente presenta 5 síntomas o mas durante al menos 2 meses. la persona depresiva puede incluir al suicidio.

Trastorno Bipolar II

Se define por un patrón de episodios depresivos e hipomaniacos que ocurren en el trastorno bipolar I.

Trastorno Ciclotímico

Es una alteración crónica y fluctuante del estado de animo que conlleva numerosas periodos de síntomas hipomaniacos y periodos de síntomas depresivos que son distintos entre si.

Trastorno de Desregulación Disruptiva del Estado de Animo. (TDDEA)

Es una irritabilidad crónica, grave y persistente . Afección en la que los niños o adolescentes experimentan arrebatados frecuentes e intensos de irritabilidad, ira y mal temperamento.

Episodios Depresivo Persistente (distimia)

Es un animo deprimido que aparece la mayor del día, durante la mayor parte de los días, durante al menos dos años o al menos durante un año en los niños y los adolescentes.

Trastorno Disfórico Premenstrual

Son la expresión de labilidad afectiva, disforia y síntomas de ansiedad que se repiten durante la fase premenstrual del ciclo y que remiten alrededor del inicio de la menstruación o poco después.

Trastorno Depresivo Inducido por una Sustancia/Medicamento.

Se caracteriza por alucinaciones y/o ideas delirantes debido a los efectos directos de una sustancia o la abstinencia de una sustancia en ausencia de delirio.

Trastorno Depresivo debido a otra Afección Medica.

Es un periodo de tiempo importante y persistente de estado de animo deprimido, o una disminución notable del interés o del placer en todas las actividades, que predomina el cuadro clínico.