Trastorno bipolar 1 Trastorno bipolar 1. Hipomaniaco y depresivo 2 depresivo Trastorno ciclotímico

Episodios hipomaniacos o episodios de depresión mavor

Estado de ánimo anormal y persistentemente elevado

Estado de ánimo anormal, expansivo o irritable, y un aumento anormal y persistente de la actividad o energía

Existen tres o más síntomas (cuatro si el estado de ánimo es irritable

Aumento del autoestima, disminución de la necesidad de dormir, más hablador de lo habitual, fuga de ideas

Trastorno bipolar

Caracterizado por un curso clínico con episodios afectivos recurrentes consistentes en uno o más episodios de depresión mayor y un episodio hipomaniaco

Episodio depresión mayor debe durar al menos 2

**Episodio** hipomaniaco debe durar al menos 4 días para cumplir los criterios diagnósticos

Trastornos depresivos y

Trastornos bipolares y Relacionados

Trastorno bipolar 2. Hipomaniaco y

Episodio hipomaniaco durante el periodo de alteración de estado de ánimo y aumento de la energía y actividad

Síntomas: Aumento del autoestima, disminución de la necesidad de dormir, mas hablador de lo habitual, facilidad de distracción

Episodio depresivo, disminución importante del interés o el placer por todas o casi todas las actividades

Alteración crónica y fluctuante del estado de ánimo que conlleva numerosos periodos de síntoma hipomaniaco

Los síntomas hipomaniacos son insuficientes en número. gravedad, generalización o duración para cumplir los criterios de un espisodio hipomaniaco

Trastorno de desregulación distuptiva del estado de ánimo

Irritabilidad crónica. grave y persistente. Esta irritabilidad tiene dos manifestaciones clínica relevante.

Acceso de cólera. Ocurren típicamente en respuestas a la frustración y pueden ser verbales o conductuales

Estado de ánimo persistente irritable o de estado crónico. Debe ser caracterizado del niño. Debe estar presente la mayor parte del día, casi diario y debe ser apreciable

Trastorno de depresión mayor Debería aparecer casi cada día, debería haber ánimo deprimido la mayor parte del día

Síntomas de presentación. Insomnio, fatiga, negación, queja somática Rasgo principal es un periodo de tiempo de al menos dos semanas durante el cual existe ánimo depresivo

Episodio depresivo persistente (distimia) Ánimo deprimido que aparece la mayor parte del día, durante al menos dos años.

Se agrupan el trastorno de depresión mayor crónica y el trastorno distímico del DSM-IV Síntomas.

Poco apetito, insomnio, fatiga, baja autoestima, sentimiento de desesperanza

Trastorno disfórico premenstrual

Expresión de labilidad afectiva, disforia y síntomas de ansiedad

Se pueden acompañar de síntomas conductuales y físicos Los síntomas deben haber aparecido en la mayoría de los ciclos menstruales durante el último año y afecta negativamente el funcionamiento laboral y social

Trastornos depresivos y

Trastornos bipolares y

Relacionados

Trastorno depresivo inducido por una sustancia/medica mento

Síntomas de un trastorno depresivo, los síntomas depresivos se asocian al consumo, la inyección o la inhalación de una sustancia

Los síntomas depresivos persisten más tiempo de la que cabría esperar de los efectos fisiológicos o del punto de intoxicación Debe haberse desarrollado durante el consumo de una sustancia capaz de producir un trastorno depresivo

Trastorno depresivo debido a otra afección médica

Período de tiempo importante y persistente de estado crónico deprimido o disminución notable del interés

El clínico debe establecer que la alteración del ánimo esta etiológicamente relacionado con la afección medica general mediante un mecanismo fisiológico