



06-07-2024

MATERIA:
Zootecnia de porcinos

**NOMBRE DEL
CATEDRÁTICO:**
Sandra Edith Moreno López

NOMBRE DE LA ALUMNA:
Eduviges Jocabed Gómez Navarro

CRÍAS DE CERDOS

VACUNAS Y DESPARASITACIONES	CUANDO SE APLICA
Peste porcina	A partir de los 90 días de gestación, cada 6 meses.
Desparasitación	5 días antes del parto
Parvovirus + leptospira	5 días antes del parto
Antroftosa	Cada 6 meses.

VACUNAS	EDAD DE APLICACIÓN EN DÍAS	ETAPAS PRODUCTIVAS
Prevención de colibacilosis	48 – 98	<i>Gestacion</i>
Prevención Eri-parvo-lept	105	<i>Gestacion</i>
Prevención peste porcina	90	<i>Gestacion</i>
Prevención neumonía enzótica	35	<i>sitio dos</i>
Prevención circovirus	14-35	<i>sitio uno y dos</i>
Prevención peste porcina	50	<i>sitio dos</i>
Prevención A. pleuroneumonía	42 – 70	Reemplazo
Prevención Eri-parvo-lept	165 – 180	Reemplazo
Prevención neumonía enzótica	150 – 175	Reemplazo
Prevención peste porcina	140	Reemplazo
Prevención circovirus	150-175	Reemplazo

CERDAS DE REMPLAZO

Desparasitación	A los días de llegada
Peste porcina	A los días de llegada
Antroftosa olerosa	A los 15 días de la rcp
Parvovirus + leptospira (1 [®])	A los 10 días de la aftosa
Parvovirus + leptospira (2 [®])	A los 15 días después de la primera dosis