



Mi Universidad

Cuadro

Nombre del Alumno: Cristian Yahir Santis Diaz

Nombre del tema: Ciclo estral

Parcial: I

Nombre de la Materia: Fisiologia

Nombre del profesor: MVZ Sandra Edith Moreno López

Nombre de la Maestría: MVZ medicina veterinaria y zootecnia

Cuatrimestre: 3

<https://reproduccionanimalesdomesticos.fmvz.unam.mx/libro/capitulo19/ciclo-estral.html>

<https://www.pequevet.com/zootecnia/el-ciclo-estral-de-las-hembras-domesticas/>

https://www7.uc.cl/sw_educ/prodanim/caracter/fi5c.htm

Hembras					
Especie	P. Ciclo	E. ciclo estral	T. ciclo	H. involucrados	Ovulación
Perra.	Entre 6 y 12 meses de edad	Proestro, Estró Diestro, Anestro	Monocstral	Estrógeno, LH (Hormona luteína Zarfo), progesterona	Ocorre durante el estró. Aparece aproximadamente 48 horas después del pico LH
Gata.	Entre 5 y 9 meses	Proestro, estró, interestro (si no diestro (si hay ovulación) anestro	Policestral estacional (Días largos)	Estrógeno, LH, Progesterona	Inducido por el apareamiento
Vaca.	Entre 6 y 13 meses	Proestro, estró, metaestro, diestro	Policestral	Estrógeno, LH, FSH (Hormona Folículo estimulante), Progesterona.	10-14 horas después del final del estró
Yegua	Entre 12 y 14 meses	Proestro, estró, metaestro, diestro	Policestral (Primavera Verano)	Estrógeno, LH, FSH, Progesterona	24-48 horas antes del final del estró
Cerdas	Entre 3 y 8 meses	Proestro, estró, metaestro, diestro	Policestral	Estrógeno, LH, FSH, Progesterona	36-44 horas después del inicio del estró
Borregos	Entre 5 y 12 meses	Proestro, estró, metaestro, diestro	Policestral estacional (otoño invierno)	Estrógeno, LH, FSH, Progesterona	Hacia el final del estró

VER GREEN			Hembras			Oblación
Especie	P. celo	El del celo estral	T. celo	H. involucentas	Inducido por el apantamiento	
Longura	Entre 4 y 6 meses.	Ciclo estral continuo sin etapas definidas.	Poliestral inducido.	Estrógeno, LH, FSH, progesterona.	A. próxima da miento cada 24 a 26 hrs	
Aves	Entre 5 y 6 meses.	Fase reproductiva continua con Oviposición diaria	Poliestral continuo	Estrógeno, LH, FSH, Progesterona		

		MARCHAS	
Especie	Inicio de libido	H. Involucrada	Identificación del celo
Canino	Alrededor de los 6-12 meses de edad	Troxostorona	Comportamiento marcado territorial, aumento de interacción con los humanos.
Felino	Alrededor de los 6-9 meses	Troxostorona	Marcado con orina, vocalización intensa, agresividad
Bovino	Aproximadamente 6-12 meses	Troxostorona	Muerte a otros animales, vocalización, olfateo y lamido de ubilla
Equino	Aproximadamente a los 12-24 meses	Troxostorona	Aumento de interacción con los humanos, erección, vocalización
Suinos	Aproximadamente a los 5-8 meses.	Troxostorona	Mucha actividad animal, vocalización, producción de saliva copiosa
Uvinos	Aproximadamente a los 6-8 meses	Troxostorona	Mucha actividad animal, producción de orina, producción de diarrea, fricción de la cabeza
Caprinos	Aproximadamente a los 6-8 meses	Troxostorona	Marcado con orina, producción de diarrea, fricción de la cabeza
Carnívoros	Aproximadamente a los 5-6 meses	Troxostorona	Aumento de la actividad territorial, agresividad