

ALUMNO: SHAILA YASMIN LÓPEZ CRUZ

PROFESOR: MARIANO RAYMUNDO HERNANDEZ HERNANDEZ

MATERIA: ENFERMERÍA MÉDICO QUIRÚRGICA

CUATRIMESTRE: 6

GRUPO: A

TRABAJO: CUADRO SINOPTICO

COMITAN DE DOMINGUEZ, CHIS.



introducción

PARA COMENZAR ESTE TEMA DEBEMOS HABLAR SOBRE QUÉ ES? ES UN TIPO DE DIÁLISIS CON LA QUE SE TRATA LA FALLA RENAL. EN ELLA SE INTRODUCE EN EL ABDOMEN UN LÍQUIDO Y DESPUÉS SE EXTRAER PARA DEPURAR LA SANGRE. LA DIÁLISIS PERITONEAL SE PUEDE HACER EN LA CASA. PRIMERO EXPLICARÉ COMO FUNCIONA ESTE PROCESO SE USA UN CATÉTER PARA LLENAR EL ABDOMEN DE UN LÍQUIDO DEPURADOR LLAMADO LÍQUIDO DE DIÁLISIS ES UN TUBO DELGADO POR EL CUAL SE INTRODUCE LÍQUIDO DE DIÁLISIS CUERPO O SE EXTRAER DE ÉL. EL LÍQUIDO DE DIÁLISIS SE DEJA EN EL ABDOMEN POR LO GENERAL DE 4 A 6 HORAS PARA QUE DEPURE LA SANGRE. ESTE TIEMPO SE LLAMA TIEMPO DE PERMANENCIA Y POR ÚLTIMO, LA PERSONA SACA DE SUS ABDOMEN EL LÍQUIDO DE DIÁLISIS MIEVA. ESTE PROCESOS SE LLAMA INTERCAMBIO, ESTOY SE PUEDEN HACER MANUELAMENTE O CON LA AYUDA DE UNA MÁQUINA Y BUENO VEREMIS MÁS A FONDO ESTE TEMA QUE TIPOS EXISTEN, LOS CUIDADO Y MUCHAS. COSAS MÁS.

Diálisis peritoneal

¿Qué es?

Tratamiento para la insuficiencia renal

Se utiliza

Revestimiento del abdomen o vientre del paciente

¿Cómo funciona?

Un cirujano se coloca al paciente un tubo blando, llamado cateteren el abdomen

La solución de diálisis fluye desde una bolsa, a través del cateter hasta el abdomen

¿Cómo se sentirá el paciente con la diálisis?

Igual que siempre

Puede sentirse lleno o inflado

Tipo de diálisis

Diálisis peritoneal continúa ambulatoria

Diálisis peritoneal automatizada

Diferencia

Programación de los intercambios

Uno usa máquina y el otro se hace manualmente

En dónde se puede realizar?

Un lugar limpio y privado, incluso en la casa, el trabajo o cuando viaja

¿Cómo se prepara al paciente para la diálisis?

Al paciente le harán una cirugía para colocar el catéter en el abdomen

Programar la colocación del catéter al menos 3 semanas antes del primer intercambio

Capacitación para la diálisis

El paciente trabajará con una enfermera de diálisis durante 1 a 2 semanas

Para evitar infecciones y lograr los intercambios

Cómo se hace un intercambio

Sete de transferencia

Solución de diálisis

Suministros para mantener limpio el sitio de salida

Rama del tema 3

Cambios que tendrá que hacer el paciente al comenzar la diálisis

Rutina diaria

Actividad física

Alimentación

Medicamentos

Adaptación

Soluciones dializadoras

1.5% amarillo

Solución baja en azúcar

Elimina la cantidad mínima de líquido

2.5% verde

Solución de dosis media

4.25% rojo

Solución alta en azúcar

Elimina la mayor cantidad de líquido



BIBLIOGRAFÍA

<https://www.niddk.nih.gov/health-information/informacion-de-la-salud/enfermedades-rinones/insuficiencia-renal/dialisis-peritoneal>

