

NOMBRE DEL ALUMNO:

BRENDA CARMONA JOACHIN

NOMBRE DEL TEMA:

TIPOS DE HERNIAS

NOMBRE DE LA MATERIA:

PATOLOGIA DEL ADULTO

NOMBRE DEL PROFESOR:


MARIANO RAYMUNDO HERNÁNDEZ

NOMBRE DE LA LICENCIATURA:

LICENCIATURA EN ENFERMERÍA

CUATRIMESTRE:

SEXTO CUATRIMESTRE



T
I
P
O
S

D
E


H
E
R
N
I
A
S

HERNIA UMBILICAL

¿QUÉ ES? Es una afección en la cual el intestino va a sobresalir a través de los músculos abdominales en la zona del ombligo.

¿CUANDO SE PRODUCE? Cuando el intestino vuelve a la cavidad abdominal en la semana 10

¿POR QUÉ SE PRODUCE? Se produce cuando los músculos abdominales no se cierran completamente, dejando una pequeña abertura por la cual saldrá una parte del intestino y formará una hernia




HERNIA ABDOMINAL

¿QUÉ ES? Las hernias de la pared abdominal a menudo se denominan hernias ventrales para diferenciarlas de las hernias inguinales, aunque técnicamente la mayoría son de la pared abdominal

TIPOS DE HERNIAS ABDOMINALES:


- Hernias epigástricas
- Hernia umbilical
- Hernia de la línea semilunar (hernia de spiegel)
- Hernia incisional



HERNIAS INGUINO-ESCROTALES

¿QUÉ ES? Afección en la que el tejido blando sobre sale por un punto débil en los músculos abdominales, ese tipo de hernias es fácil de ver y sentir el bulto excepto en los pacientes con sobrepeso.

¿POR QUÉ OCURRE? Ocurre cuando una porción de tejido, como una parte del intestino, empuja hacia afuera a través de un lugar debilitado en los músculos abdominales, puede ser doloroso, especialmente al toser o al levantar algún objeto Pesado



HERNIA VULVAR

Es una afección fundamentalmente de carácter femenino causada por una pérdida de la calidad de los tejidos vaginales y del soporte pélvico, y es una discución que tuvimos herniación del recto hacia la vagina

La causa principal por la que se produce esta afección es porque los músculos y los ligamentos se debilitan y no pueden dar el apoyo suficiente a la vagina y el recto

Además del parto y el estreñimiento crónico otra causa es por levantar objetos muy pesados y esto puede aumentar el riesgo para padecer esta afección

