



Mi Universidad

DEL ALUMNO: MERARI ABIGAIL SANCHEZ ALFARO

NOMBRE DE LA MATERIA: PATOLOGIA DEL ADULTO

NOMBRE DEL PROFESOR: MARIANO RAYMUNDO HERNANDEZ HERNANDEZ

NOMBRE DE LA LICENCIATURA: ENFERMERIA

CUATRIMESTRE: 6

FECHA DE ENTREGA:7-AGOSTO-2024

TIPOS DE HERNIAS

Una hernia umbilical se produce cuando una parte del intestino sobresale a través de la abertura de los músculos abdominales cerca del ombligo. Las hernias umbilicales son frecuentes y, en general, son inofensivas.

Síntomas

La hernia umbilical produce una leve hinchazón o bulto cerca del ombligo. En los bebés que tienen una hernia umbilical, el bulto se puede ver únicamente cuando lloran, tosen o hacen algún esfuerzo.

Complicaciones

En los niños, las complicaciones de una hernia umbilical son poco frecuentes. Las complicaciones pueden producirse cuando el tejido abdominal que sobresale queda atrapado (encarcelado) y no se puede empujar para que vuelva a la cavidad abdominal.

La hernia abdominal es una protuberancia o bulto en la región del abdomen, principalmente en la zona arriba del ombligo, dentro del ombligo o en la ingle, debido a una debilidad en los músculos abdominales,

Síntomas de hernia abdominal

Los principales síntomas de la hernia abdominal son:

- Protuberancia o bulto en o encima del ombligo, o en la ingle, que suele agrandarse al realizar esfuerzos abdominales;
- Dolor o malestar en el sitio de la hernia;
- Dolor abdominal;
- Hinchazón y enrojecimiento en el sitio de la hernia;
- Náuseas;

en el caso de las hernias inguinales, son protuberancias en la ingle. Este tipo es más común en los hombres y puede desarrollarse hasta bajar al escroto. Alrededor del 75 por ciento de todas las hernias se presentan en la región inguinal.

Síntomas

Los signos y los síntomas de la hernia inguinal incluyen:

- Un bulto en el área sobre cualquiera de los lados del pubis, que se hace más notorio cuando estás erguido y especialmente si toses o haces algún esfuerzo
- Una sensación de ardor o de dolor en el área del bulto
- Dolor o incomodidad en la ingle, especialmente cuando te inclinas, toses o levantas peso
- Una sensación de pesadez o arrastre en la ingle

cómo se produce una Hernia Escrotal?

Se produce cuando el tejido empuja un punto débil en el músculo de la ingle formando un bulto en esa extremidad del cuerpo. Dependiendo del tamaño puede causar dolor al toser o levantar objetos pesados.

Síntomas de una Hernia Escrotal

Lo primero para detectar una Hernia Escrotal es detectar un bulto en la ingle o el escroto, en algunas ocasiones en redondo.

Puede formarse en períodos de pocas semanas, meses o años. En algunas oportunidades no genera dolor ni molestias graves en el afectado, siempre y cuando su tamaño no sea extremadamente grande.

Este tipo de hernias pueden causar inflamación en la zona afectada (escroto) y una sensación de pesadez, incluso ardor, mejorando cuando el cuerpo se encuentra en reposo.

También pueden presentarse síntomas como náuseas o vómito, cuando la hernia presiona que una parte del intestino.