



NOMBRE DE EL ALUMNO: Carlos Alejandro Moreno García

NOMBRE DE EL PROFESOR: JOSUE ALEJANDRO ROBLERO DIAZ

MATERIA: PRACTICA CLINICA DE ENFERMERIA

CUATRIMESTRE. 6to Cuatrimestre

NOMBRE DEL TRABAJO: libreta salvavidas

FECHA: 11 /08/24


PATRONES RESPIRATORIOS



Eupnea
respiración normal
(15-20 rpm)




Bradipnea
frecuencia disminuida
(< 12 rpm)



Hiperpnea
mayor profundidad respiratoria



Taquipnea
frecuencia aumentada
(≥ 20 rpm)



Apnea
ausencia de respiración



Biot
periodos más rápidos y profundos de lo normal, pero con respiraciones iguales se alternan con pausas de apnea

Esquema de vacunación.

Nacimiento	BCG	Hepatitis B	Hepatitis B	Neumococo Conjugado
2 meses	Pentavalente acelular	Hepatitis B	Rotavirus	Neumococo Conjugado
4 meses	Pentavalente acelular		Rotavirus	Neumococo Conjugado
6 meses	Pentavalente acelular	Hepatitis B	Rotavirus	Influenza
7 meses	Influenza segunda dosis			
12 meses	SRP			
18 meses	Pentavalente acelular			
24 meses (2 años)	Influenza refuerzo anual			
36 meses (3 años)	Influenza refuerzo anual			
48 meses (4 años)	DPT (Refuerzo)			Influenza refuerzo anual
5 años	Refuerzo anual Influenza (octubre - enero)			
5 años	OPV (Polio oral) dosis base 4 meses en 1 ^{ra} y 2 ^{da} Semanas nacionales de Salud			
72 meses (6 años)	SRP (Refuerzo)			
11 años o Quinto grado de Primaria	VPH (virus del Papiloma Humano)			

SITIO DE APLICACION VACUNAS

Vacuna	Sitio de aplicacion
BCG	Brazo derecho
Hepatitis B	< 18 meses de edad & muslo izquierdo > 18 meses Brazo derecho
Pentavalente acelular	< 18 meses de edad & muslo derecho > 18 meses Brazo izquierdo
neumococo (conjugado y 23 valente)	< 18 meses de edad & muslo derecho
Rotavirus	oral
SAP	Brazo izquierdo
SR	Brazo izquierdo
TD	Brazo izquierdo
DPT	Brazo izquierdo
TOPA	Brazo izquierdo
VPH	Brazo derecho
Influenza inactivada	< 18 meses de edad & muslo izquierdo > 18 meses & Brazo izquierdo
Poliomielitis tipo Sabin	oral
Varicela	Brazo izquierdo
Hepatitis A	< 18 meses de edad & muslo izquierdo > 18 meses & Brazo izquierdo

PUPILAS

ISOCORIA
Pupilas de igual tamaño




MIOSIS
Contracción excesiva de las pupilas




MIDRIASIS
Dilatación excesiva de las pupilas



ANISOCORIA
Pupilas de tamaño desigual



90% Via Parental (4 formas de administración de inyectables)



BIBLIOGRAFIA

UDS. (2024). Antología de práctica clínica de enfermería I.PDF.

Práctica clínica. ([GUÍAS DE PRÁCTICAS CLÍNICAS PARA ENFERMERÍA \(youtube.com\)](#))