



**Mi Universidad**

**Cuadro sinóptico**

*Nombre del Alumno: Petronita Angelica May Landero*

*Nombre del tema: Hernias*

*Parcial : 2*

*Nombre de la Materia: Patología del adulto*

*Nombre del profesor: Mariano Raymundo Hernandez Hernandez*

*Nombre de la Licenciatura : Enfermería*

*Cuatrimestre: 6*

# HERNIAS

## Concepto

Es una protuberancia de un órgano o de parte de un órgano a través de la pared de la cavidad que normalmente lo contiene

## Causas

Se produce cuando hay una debilidad o un desgarro de la pared abdominal, a consecuencia del envejecimiento, una lesión, una incisión quirúrgica antigua o una afección congénita

## Umbilical



Afección caracterizada por una protrusión del intestino a través de los músculos abdominales a la altura del ombligo

### Causas

### Complicaciones

Pueden producirse cuando el tejido abdominal que sobresale queda atrapado (encarcelado) y no se puede empujar para que vuelva a la cavidad abdominal.

- \*Obesidad
- \*Embarazos múltiples
- \*Líquido en la cavidad abdominal
- \*Cirugía abdominal previa
- \*Diálisis peritoneal a largo plazo para tratar la \*insuficiencia renal

## Abdominal



Protrusión del contenido abdominal a través de una zona adquirida o congénita de debilidad o defecto de la pared.

### Síntomas

Levantar demasiado peso o realizar esfuerzos de modo excesivo pueden provocar que la hernia sea más evidente, pero no causan su formación

Clasificación: Hernias umbilicales, Hernias epigástricas, Hernias de Spiegel, Hernias incisionales (ventrales)

- \*Náuseas, vómitos o ambos.
- \*Fiebre
- \*Dolor repentino que se intensifica rápidamente.
- \*Un bulto de la hernia que se pone rojo, violáceo o de color oscuro.
- \*Incapacidad para evacuar el intestino o eliminar gases

## Tipos

## Inguinal



Es una protuberancia en la ingle, este tipo es más común en los hombres, puede bajar hasta el escroto

### Causas

### Síntomas

\*Sensación de ardor o de dolor en el área del bulto

\*Dolor o incomodidad en la ingle, especialmente cuando te inclinas, toses o levantas peso

\*Sensación de pesadez o arrastre en la ingle

\*Debilidad o presión en la ingle

- \*Aumento de la presión dentro del abdomen
- \*Esfuerzo al defecar u orinar
- \*Actividades intensas

## Vulvar



Una hernia se produce por un descenso o caída de un órgano hacia otro orificio y, en este caso concreto la caída del recto hacia la vagina.

### Síntomas

### Causa

Se produce esta afección es porque los músculos y los ligamentos se debilitan y no pueden dar el apoyo suficiente a la vagina y el recto, concretamente, esto sucede en el tabique rectovaginal, que es el que separa el recto de la vagina y es el que puede llegar a debilitarse causando un rectocele.

Presencia de un bulto blando de tejido que puede sobresalir por la abertura vaginal, estreñimiento, pérdida de evacuaciones intestinales por el recto, dolor en la parte inferior de la espalda que desaparece al acostarse, presión en la vagina al orinar y mantener relaciones sexuales

## BIBLIOGRAFÍA

[https://www.ecured.cu/Hernia\\_umbilical](https://www.ecured.cu/Hernia_umbilical)

[https://www.ecured.cu/Hernia\\_abdominal](https://www.ecured.cu/Hernia_abdominal)

<https://cuidateplus.marca.com/enfermedades/digestivas/rectocele.html#:~:text=Es%20una%20afecci%C3%B3n%20fundamentalmente%20de,el%20recto%20y%20la%20vagina.>

<https://www.mayoclinic.org/es/diseases-conditions/inguinal-hernia/symptoms-causes/syc-20351547>