Nombre del alumno: Andrea Delina Morgan Villatoro

Nombre del tema: Tipos de hernias

Nombre de la materia: Patología del adulto

Nombre del profesor: Mariano Hernández Hernández

Licenciatura: Enfermería

6to cuatrimestre

8-Agosto-2024

Tipos de Hernias

Hernia umbilical

Una hernia umbilical ocurre cuando una parte del intestino sobresale a través de una abertura en los músculos abdominales cerca del ombligo

Causas

Congénitas: En los recién nacidos, la hernia umbilical puede ser causada por una abertura en la pared abdominal que no se cierra adecuadamente después del nacimiento

Adquiridas: En adultos, puede ser resultado de presión abdominal excesiva debido a factores como obesidad, embarazo múltiple, ascitis (acumulación de líquido en el abdomen), o cirugía abdominal previa

Hernia abdominal

Una hernia abdominal es una protuberancia o bulto en la región del abdomen debido a una debilidad en los músculos abdominales. Esto permite que una parte del intestino u otro órgano sobresalga a través de la pared abdominal

Tipos comunes de hernias abdominales

Tipos Comunes de Hernias Abdominales

1 - Hernia inguinal: Ocurre en la ingle y es más común en hombres.

2 - Hernia femoral: Se presenta en la parte superior del muslo, justo debajo de la ingle, y es más frecuente en mujeres.

3- Hernia umbilical: Aparece alrededor del ombligo.

4- Hernia incisional: Se desarrolla en el sitio de una cirugía previa.

5 - Hernia epigástrica: se encuentra en la parte superior del abdomen, entre ombligo y esternón.

Hernia inguinal

Una hernia inguinal ocurre cuando una parte del tejido, como una porción del intestino, sobresale a través de un punto débil en los músculos abdominales.

Síntomas

- Bulto en la ingle: Puede ser más notorio cuando estás de pie, toses o haces esfuerzo.
- Dolor o incomodidad: Especialmente al inclinarse, toser o levantar objetos pesados.
- Sensación de ardor o dolor: En el área del bulto.
- Pesadez o arrastre: En la ingle, especialmente al final del día o después de actividad prolongada.
- Hinchazón en el escroto:

Causas y factores de riesgo

- Debilidad en la pared abdominal: Puede ser congénita o adquirida.
- Aumento de la presión abdominal: Por esfuerzo físico, tos crónica, estreñimiento, embarazo, entre otros.
- Factores de riesgo: Edad avanzada, sexo masculino, historia familiar, y actividades que aumentan la presión abdominal

Hernia escrotal

Una hernia escrotal es un tipo de hernia inguinal en la que el bulto que se forma en la ingle desciende hacia el escroto, causando inflamación y dolor en esa área

Síntomas

- Bulto en el escroto: Puede ser más notorio al estar de pie, toser o levantar objetos pesados.
- Dolor o incomodidad: En el escroto o la ingle, especialmente al realizar actividades físicas.
- Sensación de pesadez o presión: En la región escrotal al caminar.
- Náuseas o vómitos: Si la hernia presiona una parte del intestino

Causas

Causas y Factores de Riesgo

- Debilidad en la pared abdominal: Puede ser congénita o adquirida.
- Aumento de la presión abdominal: Por esfuerzo físico, tos crónica, estreñimiento, entre otros.
- Factores de riesgo: Edad avanzada, sexo masculino, historia familiar, y actividades que aumentan la presión abdominal

Hernia Vulvar

Una hernia vulvar es una condición rara en la que una parte del tejido, como el intestino, sobresale a través de un punto débil en la pared abdominal y se extiende hacia la vulva.

Síntomas

- Bulto en la vulva: Puede ser más notorio al estar de pie, toser o levantar objetos pesados.
- Dolor o incomodidad: En la vulva, especialmente al realizar actividades físicas.
- Sensación de pesadez o presión: En la región vulvar

Causas y factores de riesgo

- Debilidad en la pared abdominal: Puede ser congénita o adquirida.
- Aumento de la presión abdominal: Por esfuerzo físico, tos crónica, estreñimiento, entre otros.
- Factores de riesgo: Edad avanzada, historia familiar, y actividades que aumentan la presión abdominal