



Mi Universidad

Cuadro sinóptico

Iván Alejandro Penagos Trujillo

Tipos de hernias

Parcial II

Patología del adulto

Mariano Raymundo Hernández Hernández

Licenciatura en Enfermería

6to. Cuatrimestre

TIPOS DE HERNIAS

Umbilical

Se produce cuando una parte del intestino sobresale a través de la abertura de los músculos abdominales cerca del ombligo, son frecuentes y por lo general son inofensivas, crea hinchazón o un bulto pequeño cerca del ombligo, son más frecuentes en los bebés pero también puede afectar a los adultos.

Abdominal

Es una abertura o área de debilidad en la pared abdominal a través de la cual puede sobresalir el contenido abdominal, causa una protuberancia perceptible pero con pocas molestias, se diagnostica por la exploración física y a veces con ayuda de una ecografía, este tipo de hernias requiere cirugía reparadora.

Inguinal

Ocurren cuando parte de la membrana que recubre la cavidad abdominal (epiplón) o el intestino sobresalen por un orificio débil en el abdomen, generalmente por el conducto inguinal, que sostiene el cordón espermático en los hombres, el bulto que se produce puede ser doloroso, especialmente al toser, inclinarse o levantar un objeto pesado.

Escrotal

Es la protrusión de una porción del intestino o de otro órgano abdominal a través de una abertura de la pared abdominal en la ingle, las personas que lo padecen presentan una protuberancia en la ingle o el escroto, a veces puede ser indolora o causar molestias si crece.

Vulvar

Es una afección fundamentalmente de carácter femenino causada por una pérdida de la calidad de los tejidos vaginales y del soporte pélvico, que puede dar paso a un debilitamiento y desgarramiento de los tejidos que soportan el recto y la vagina, causando un bulto que se puede poner rojo o de color oscuro y provocar la incapacidad para evacuar el intestino o eliminar gases.