



NOMBRE DE EL ALUMNO: Carlos Alejandro Moreno García

NOMBRE DE EL PROFESOR: mariano Raymundo Hernández Hernández

MATERIA: patología del adulto

CUATRIMESTRE. 6to Cuatrimestre

NOMBRE DEL TRABAJO: cuadro sinóptico

FECHA: 07/08/24

Tipos de hernias

Umbilical

Es una afección caracterizada por una protusión del intestino a través de los músculos abdominales
A la altura del ombligo los más propensos a tener esto son

recién nacidos y bebés
adultos con sobre peso
Mujer en embarazo y postparto

CAUSA

se produce debido al tejido de la pared muscular del abdomen está debilitado y aplica una presión interna

Factores riesgo

embarazo y esfuerzo durante partos muy prolongados
esfuerzo por estreñimiento crónico
Tos crónica por enfermedades pulmonares, sobre peso y obesidad

Más comunes

Abdominal

Hernia epigástrica
Se produce a través de la línea alba
es habitual en el hombre rara vez tiene estructuras viscerales

Hernia de spiegel
Se produce a través de defectos del musculo transverso del abdomen por fuera de la vaina de los rectos, en general
Infla umbilicales en general se presenta en personas de mediana edad

Hernia umbilical

protrusiones a través del anillo umbilical en su mayoría son congénitas pero algunas son adquiridas en la adultez por obesidad, aceites, embarazos o diálisis peritoneal.

Hernia incisional

se produce a través de la incisión de una cirugía abdominal previa

VENTRALES

Inguinal

Es la protusión o salida al exterior del contenido de una cavidad generalmente a través de un orificio
Natural o de una zona de debilidad de la pared que lo contiene, daño del tejido blando de los músculos del abdomen

se refiere cuando el intestino o tejido graso sobresale de la ingle este tipo de hernia principalmente en hombres
se puede sentir una dolorosa sensación de arrastre así como dolor e hinchazón en el escroto y testículos

hernia inguinal indirecta

Más frecuentes en hombres que en mujeres en relación del 9 a 1 por desarrollo embriológico testicular

hernia inguinal directa

raro en mujeres por tener esta, la pared posterior es más resistente

Escrotal

Masa unilateral hinchada localizada en la parte posterior de las piernas traseras
Por debajo del ano

SINTOMAS

aparición de un bulto a nivel de la ingle o del escroto
el bulto puede ser asintomático puede producir una sensación de ocupación o molestia en la ingle

Bulbar

Afección fundamentalmente de carácter femenino causada por una pérdida de calidad de los tejidos vaginales y del soporte pélvico

por lo que puede dar lugar a un debilitamiento y desgarramiento de los tejidos que soportan el recto y vagina

El adulto mayor <https://www.youtube.com/watch?v=MvYGTvxmak>