



Alumna: CRISOLITO GARCIA HERNANDEZ

Profesor: MARIANO RAYMUNDO HERNANDEZ HERNANDEZ

Materia: PATOLOGIA DEL ADULTO

Tema: TIPOS DE HERNIAS (HUMBILICAL, ABDOMINAL, INGUINAL, ESCRUTAL, VULVAR)

6TO CUATRIMESTRE

GRUPO C

LIC. EN ENFERMERIA

## TIPOS DE HERNIAS

### HUMBILICAL

Una hernia umbilical se produce cuando una parte del intestino sobresale a través de la abertura de los músculos abdominales cerca del ombligo. Las hernias umbilicales son frecuentes y, en general, son inofensivas.

**Causas:** La hernia umbilical produce una leve hinchazón o bulto cerca del ombligo. En los bebés que tienen una hernia umbilical, el bulto se puede ver únicamente cuando lloran, tosen o hacen algún esfuerzo

**Factores de riesgo:** Las hernias umbilicales son más frecuentes en los niños, en especial en los bebés prematuros y en aquellos con bajo peso al nacer

### ABDOMINAL

**Una hernia de la pared abdominal es una abertura o área de debilidad en la pared abdominal a través de la cual puede sobresalir el contenido abdominal**

**Síntomas:** Una hernia de la pared abdominal es una abertura o área de debilidad en la pared abdominal a través de la cual puede sobresalir el contenido

**Diagnóstico:** Los médicos establecen el diagnóstico de las hernias basándose principalmente en la exploración física. Los bultos en la ingle que parecen hernias pueden ser ganglios linfáticos inflamados

**Tratamiento:** Los médicos establecen el diagnóstico de las hernias basándose principalmente en la exploración física. Los bultos en la ingle que parecen hernias pueden ser ganglios linfáticos inflamados

### INGUINAL

Las hernias inguinales se producen cuando parte de la membrana que recubre la cavidad abdominal (epiplón) o el intestino sobresale por un orificio débil en el abdomen (generalmente por el conducto inguinal, que sostiene el cordón espermático en los hombres)

**Signos y síntomas:** Un bulto en el área sobre cualquiera de los lados del pubis, que se hace más notorio cuando estás erguido y especialmente si toses o haces algún esfuerzo, Una sensación de ardor o de dolor en el área del bulto Dolor o incomodidad en la ingle, especialmente cuando te inclinas, toses o levantas peso

**Causas:** Algunas hernias inguinales no tienen una causa aparente. Otras pueden ocurrir como resultado de lo siguiente Aumento de la presión dentro del abdomen, efecto al defecar u orinar, embarazo

**Prevención:** Mantener un peso saludable, dejar de fumar, no levantar objetos pesados

# TIPOS DE HERNIAS

## ESCRUTAL

Las personas afectadas presentan una protuberancia en la ingle o en el escroto, que puede ser indolora o causar molestias si se agranda.

El tejido blando suele ser parte del intestino. Es fácil ver y sentir el bulto, aunque no todos son visibles para los pacientes, especialmente en casos de sobrepeso.

El tejido blando suele ser parte del intestino. Es fácil ver y sentir el bulto, aunque no todos son visibles para los pacientes, especialmente en casos de sobrepeso.

## VULVAR

Una hernia inguinal es la protrusión de una porción del intestino o de otro órgano abdominal a través de una abertura de la pared abdominal en la ingle. Las personas afectadas presentan una protuberancia en la ingle o en el escroto, que puede ser indolora o causar molestias si se agranda

Causas: Una hernia inguinal es la protrusión de una porción del intestino o de otro órgano abdominal a través de una abertura de la pared abdominal en la ingle. Las personas afectadas presentan una protuberancia en la ingle o en el escroto, que puede ser indolora o causar molestias si se agranda

Síntomas: Una hernia inguinal es la protrusión de una porción del intestino o de otro órgano abdominal a través de una abertura de la pared abdominal en la ingle. Las personas afectadas presentan una protuberancia en la ingle o en el escroto, que puede ser indolora o causar molestias si se agranda

Diagnóstico: El primer paso para el diagnóstico de esta afección es que el especialista pregunte a la paciente sobre su estilo de vida, embarazos anteriores o qué enfermedades ha padecido