



Mi Universidad

Mapa Conceptual

Nombre del Alumno: Keren Magaly Sánchez Antonio

Nombre del tema: "Ostomías de eliminación fecal"

Parcial: I ro

Nombre de la Materia: Patología del adulto

Nombre del profesor: Mariano Raymundo Hernández Hernández

Nombre de la Licenciatura: Enfermería

Cuatrimestre: 6to "C"

INTRODUCCION

Una ostomía de eliminación fecal es una intervención quirúrgica que crea una abertura en la pared abdominal para desviar el contenido intestinal hacia una bolsa externa. Esto se realiza cuando partes del intestino no pueden funcionar adecuadamente debido a enfermedades, lesiones o complicaciones quirúrgicas. Existen varios tipos de ostomías de eliminación fecal, y cada una depende de la ubicación y la extensión del problema intestinal:

Colostomía: Esta ostomía se realiza en el colon (intestino grueso). Dependiendo de la parte del colon que se desvía, la colostomía puede ser:

- Ascendente: Se coloca en la parte ascendente del colon. La salida es más líquida debido a que los desechos no han pasado por la mayor parte del colon.
- Transversa: Se ubica en el colon transversal. La salida puede ser semilíquida a semisólida.
- Descendente: Se coloca en el colon descendente. Los desechos son más sólidos.
- Sigmoides: Se ubica en el colon sigmoide. La salida es casi normal en consistencia.

Ileostomía: Esta ostomía se realiza en el íleon, la parte final del intestino delgado. Los desechos son generalmente más líquidos y ricos en enzimas digestivas, lo que puede ser irritante para la piel alrededor de la ostomía.

Cecostomía: Es una ostomía menos común que se realiza en el ciego, la primera parte del intestino grueso. Generalmente se realiza en casos específicos, como para aliviar una obstrucción intestinal en pacientes pediátricos.

OSTOMIAS DE ELIMINACION FECAL

Intervención quirúrgica en la que se hace una abertura para permitir el paso del contenido intestinal desde el intestino hacia la incisión de la estoma

Existen varios tipos, y cada una depende de la ubicación y la extensión del problema intestinal

CLASIFICACION

COLOSTOMÍA

Se realiza en el colon (intestino grueso)

Dependiendo de la parte del colon que se desvía

Puede ser

ASCENDENTE

La parte ascendente del colon. La salida es más líquida

TRANSVERSA

Colon transverso. La salida puede ser semilíquida a semisólida

DESCENDENTE

Colon descendente. Los desechos son más sólidos

SIGMOIDEA

Colon sigmoide. La salida es casi normal en consistencia

ILEOSTOMIA

Se realiza en el íleon

parte final del intestino delgado

Los desechos son generalmente más líquidos y ricos en enzimas digestivas

puede ser irritante para la piel alrededor de la ostomía

CECOSTOMIA

Ostomía menos común que se realiza en el ciego

primera parte del intestino grueso

Generalmente se realiza en casos específicos

como

aliviar una obstrucción intestinal en pacientes pediátricos

BIBLIOGRAFÍA

<https://www.saludcastillayleon.es/AulaPacientes/es/enfermedades/ostomias/recomendaciones-personas-ostomia/ostomia-tipos-ostomias>

<https://www.hollister.com.mx/es-mx/ostomycare/ostomylearningcenter/understandinganostomy/the3typesofostomies>