



Mi Universidad

CUADRO SINÓPTICO

Nombre del Alumno: *Keren Magaly Sánchez Antonio*

Nombre del tema: *“Tipos de hernias: Umbilical, abdominal, inguinal, escrotal y vulvar”*

Parcial: *I ro*

Nombre de la Materia: *Patología del adulto*

Nombre del Profesor: *Mariano Raymundo Hernández Hernández*

Nombre de la Licenciatura: *Enfermería*

Cuatrimestre: *6to “C”*

HERNIAS

Saco formado por el revestimiento de la cavidad abdominal (peritoneo). El tipo de hernia depende de la ubicación.

Suele ser resultado de un sobre esfuerzo.

El saco pasa a través de un agujero o área débil en la capa fuerte de la pared abdominal que rodea el musculo.

UMBILICAL

Es una protuberancia alrededor del ombligo. Sucede cuando el musculo alrededor del ombligo no se cierra completamente después del nacimiento.

ABDOMINAL

- Una hernia de la pared abdominal causa una protuberancia perceptible, pero pocas molestias.
- El diagnóstico se establece por la exploración física y a veces con ayuda de una ecografía.
- Se requiere cirugía reparadora de la hernia.

INGUINAL

Es una protuberancia en la ingle. Este tipo es más común en los hombres, puede bajar hasta el escroto.

ESCROTAL

Está causada por un fallo después del descenso del testículo, o por un fallo en la involución en el anillo inguinal interno.

Las personas afectadas presentan una protuberancia en la ingle o en el escroto, que puede ser indolora o causar molestias si se agranda.

VULVAR

Afección fundamentalmente de carácter femenino causada por una pérdida de la calidad de los tejidos vaginales y del soporte pélvico, lo que puede dar lugar a un debilitamiento y desgarro de los tejidos que soportan el recto y la vagina.

BIBLIOGRAFÍA

<https://plataformaeducativauds.com.mx/assets/docs/libro/LLEN/16ee25b099a5c093ee45c714fb622b44-LC-LLEN604%20PATOLOGIA%20DEL%20ADULTO.pdf>