



**Catedrático: Adriana
Yasmin López Gómez**

**Alumno: Wendy
Guadalupe Díaz castro**

**Materia: fundamentos de
enfermería**

Modalidad: enfermería 3

Prevención de infecciones de transmisión sexual

Cuando sea posible, debe utilizarse un preservativo en toda actividad sexual vaginal y anal, la prevención es muy importante para prevenir infecciones que te pueden transmitir la otra persona.

Métodos de prevención

Se debe usar un nuevo preservativo cada vez que su adolescente tiene sexo.

Los preservativos se deben manipular con cuidado para evitar que se rompan o corarlos con las uñas, los dientes o instrumentos afilados.

Un preservativo se debe colocar en el pene después de que está erecto y antes de cualquier contacto genital.



Clamidia
Herpes genital
Gonorrea
VIH
VPH
Ladillas
Sífilis
Tricomoniasis

Qué causa las infecciones de transmisión sexual?
Las causas de las ITS pueden ser bacterias, virus y parásitos.



La mayoría de las ITS afectan a hombres y a mujeres, pero en muchos casos los problemas de salud que causan pueden ser más graves en mujeres. Si una ITS pasa al bebé, puede causarle graves problemas de salud.

Las ITS no siempre presentan síntomas, o solo pueden causar síntomas leves. Por lo mismo, es posible tener una infección y no saberlo. E incluso sin síntomas, las ITS pueden ser dañinas y se pueden transmitir a través de las relaciones sexuales.




Los antibióticos pueden tratar las ITS causadas por bacterias o parásitos. No existe cura para las ITS causadas por un virus, pero a menudo los medicamentos antivirales pueden ayudar con los síntomas y reducir su riesgo de propagar la infección.


las infecciones de transmisión sexual hasta hoy en día solo tienen tratamiento no hay una cura efectiva para ellos, como el SIDA no hay cura, solamente le pueden dar un control más no curarlo



PREVENCIÓN



para prevenir una enfermedad de transmisión sexual tienes que usar protección (condón)



enfermedades

- Clamidia.
- Herpes genital.
- Gonorrea.
- VIH.
- VPH.
- Ladillas.
- Sífilis.
- Tricomoniasis.

tratamiento



Los antibióticos, a menudo en una sola dosis, pueden curar muchas infecciones de transmisión sexual de origen bacteriano o parasitario, como la gonorrea, la sífilis, la clamidia y la tricomoniasis. Una vez que comiences el tratamiento con antibióticos, debes tomar toda la cantidad que te recetaron.

Síntomas

Muchas de las personas con VPH no desarrollan síntomas, aunque igualmente pueden infectar a otras personas mediante el contacto sexual. Los síntomas incluyen verrugas en los genitales o la piel de los alrededores.

Causas

- no utilizar protección
- tener relaciones con desconocidos
- no orinar después de tener relaciones
- No preguntarle a la otra persona si tiene alguna enfermedad que te pueda transmitir



las enfermedades es un virus que se transmite

BIBLIOGRAFÍA

<https://www.who.int/es/news-room/fact-sheets/detail/sexually-transmitted-infections->

[. \(stis\)#:~:text=Prevenci%C3%B3n%20de%20las%20ITS&text=Cuando%20sea%20posible%2C%20debe%20utilizarse,la%20infecci%C3%B3n%20por%20el%20VP](https://www.who.int/es/news-room/fact-sheets/detail/sexually-transmitted-infections-(stis)#:~:text=Prevenci%C3%B3n%20de%20las%20ITS&text=Cuando%20sea%20posible%2C%20debe%20utilizarse,la%20infecci%C3%B3n%20por%20el%20VP)

H.