

## Cuestionario de anestesia

1. ¿Cuál es el objetivo principal de la valoración preanestésica?

A) Diagnosticar enfermedades del paciente.

**B) Determinar el tipo de anestesia adecuada.**

C) Proporcionar sedación profunda.

D) Monitorear signos vitales durante la cirugía.

2. ¿Cuál de los siguientes es un sedante barbitúrico utilizado comúnmente en anestesia?

A) Midazolam

B) Propofol

**C) Tiopental**

D) Sevoflurano

3. ¿Qué medicamento se administra para reducir secreciones durante la anestesia?

A) Antiemético

**B) Opioide**

C) Anticolinérgico

D) Sedante

4. ¿Qué tipo de anestesia se usa comúnmente en pequeñas incisiones y biopsias?

A) Anestesia inhalada

B) Anestesia espinal

**C) Infiltración anestésica**

D) Bloqueo nervioso regional

5. ¿Cuál es una complicación posible de la intubación traqueal?

A) Hipotensión severa

B) Infección en el sitio de punción

**C) Daño a las cuerdas vocales**

D) Parálisis del nervio ciático

6. ¿Cuál de las siguientes opciones es un anestésico inhalado común?

**A) Sevoflurano**

B) Propofol

C) Ketamina

D) Lidocaína

7. ¿Qué equipo se necesita para una intubación por laringoscopia directa?

A) Sonda nasogástrica y cánula de traqueostomía

**B) Hoja de laringoscopio y jeringa de insuflación**

C) Fibroscopio y cánula de oxígeno

D) Mascarilla laríngea y guía maleable

8. ¿Qué técnica de intubación es recomendada para pacientes con vías aéreas difíciles?

A) Intubación nasotraqueal

B) Intubación videoasistida

C) Intubación con fibroscopio flexible

**D) Intubación retrógrada**

9. ¿Cuál es una complicación de la anestesia espinal o subaracnoidea?

A) Náuseas y vómitos

B) Parálisis de extremidades superiores

**C) Dolor de cabeza postpunción**

D) Amnesia prolongada

10. ¿Cuál es un relajante muscular utilizado en anestesia para facilitar la intubación?

A) Ketamina

**B) Etomidato**

C) Succinilcolina

D) Lidocaína

## Cuestionario preoperatorio

1. ¿Qué se entiende por fase preoperatoria en un contexto quirúrgico?

A) Preparación del personal médico para la operación.

**B) Manejo integral del paciente quirúrgico antes de la operación.**

C) Realización de la operación en pacientes de riesgo.

D) Evaluación de la cirugía postoperatoria.

2. ¿Cuál de las siguientes pruebas se realiza de forma rutinaria para evaluar el estado funcional de los órganos previo a una intervención quirúrgica?

**A) Determinación de grupo sanguíneo y Rh.**

B) Tomografía computarizada de alta resolución.

C) Evaluación psicológica.

D) Prueba de esfuerzo cardiovascular.

3. ¿Qué documento regula el uso y contenido del expediente clínico en México?

**A) NOM168-SSA1-1998.**

B) Código de Ética de la SSA.

C) Reglamento General de Salud.

D) Norma de Atención Hospitalaria.

4. Según la clasificación de riesgo ASA, ¿cómo se clasifica un paciente con enfermedad sistémica leve, como hipertensión controlada?

A) Clase I.

**B) Clase II.**

C) Clase III.

D) Clase IV.

5. ¿Qué tipo de intervención quirúrgica se realiza cuando la vida del paciente no depende de su ejecución inmediata, pero podría complicarse con el tiempo?

A) Urgente.

**B) Electiva.**

C) Necesaria.

D) Programada.

6. En el preoperatorio, ¿cuál es una de las recomendaciones para la preparación física del paciente?

A) Realizar baños con clorhexidina durante cinco días.

**B) Evitar la alimentación líquida durante 24 horas.**

C) Aplicación de compresas de calor en la zona quirúrgica.

D) Mantener al paciente en posición de descanso durante tres días.

7. ¿Cuál de los siguientes exámenes se utiliza comúnmente en el preoperatorio para detectar tuberculosis pulmonar en pacientes mayores de 40 años?

A) Electrocardiograma.

B) Telerradiografía de tórax en PA.

**C) Prueba de función pulmonar.**

D) Biometría hemática.

8. ¿Qué significa el término “diagnóstico diferencial” en el contexto preoperatorio?

A) Determinación de todos los posibles tratamientos quirúrgicos.

**B) Identificación de las diferentes causas posibles de los síntomas.**

C) Elección del mejor método anestésico para la operación.

D) Identificación del equipo quirúrgico adecuado.

9. En pacientes quirúrgicos, ¿qué tipo de riesgo aumenta significativamente debido a la inmovilización prolongada en cama?

A) Hipertensión.

**B) Enfermedad tromboembólica.**

C) Hipotiroidismo.

D) Deshidratación.

10. ¿Qué se debe asegurar en la exploración física de un paciente durante la fase diagnóstica?

**A) Completarla en el menor tiempo posible.**

B) Utilizar siempre instrumentos avanzados.

C) Respetar el pudor del paciente y cubrir zonas no exploradas.