



MIASTENIA GRAVIS

Enfermedad neuromuscular autoinmune causada por anticuerpos que se dirigen contra la membrana muscular postsináptica.

SIGNOS Y SÍNTOMAS MÁS FRECUENTES

- Síntomas oculares de ptosis y/o diplopía.
- Síntomas bulbares como disartria, disfagia y fatiga a la masticación.
- Debilidad proximal de extremidades.

PRUEBA DE LA BOLSA DE HIELO (ICE PACK TEST)



EPIDEMIOLOGÍA

10 y 30 casos por millón (incidencia).
Mujeres <40 años, hombres (>50 años)

Es la debilidad muscular fluctuante, que empeora con el ejercicio.

ANTICUERPOS ANTI-MUSK (TIROSIN-CINASA MUSCULAR ESPECÍFICA)

PRUEBAS ELECTROFISIOLÓGICAS

PRUEBA DE ESTIMULACIÓN NERVIOSA REPETITIVA (PNR)

ELECTROMIOGRAFÍA DE FIBRA SIMPLE O ÚNICA

DIAGNÓSTICO

En los pacientes con diagnóstico clínico de Miastenia Gravis, se debe confirmar el diagnóstico por medio de pruebas inmunológicas y/o pruebas electrofisiológicas.



DIAGNÓSTICO DIFERENCIAL: SÍNDROME DE LAMBERT-EAON

TIMOMA=TIMECTOMÍA

TRATAMIENTO

- **La azatioprina (AZA)** es un análogo de purina, que interfiere con la síntesis de ADN e interrumpe la proliferación de los linfocitos B y T.
- Timectomía

