



Docente: Dr. Guillermo Del Solar Villarreal.

Alumna: Evelin Samira Andres Velazquez.

Licenciatura: Medicina Humana.

7° Semestre 4° Parcial.

Materia: Clínicas Quirúrgicas Complementarias.

Tema: Trastornos isquémicos intestinales.

Actividad: Cuestionario.

## CUESTIONARIO

¿Cuál de las siguientes es la clasificación de los trastornos isquémicos intestinales?

- a) Isquemia mesentérica anterior, posterior y colitis isquémica.
- b) Isquemia mesentérica aguda, crónica y colitis isquémica.
- c) Isquemia mesentérica profunda, media y colitis nerviosa.
- d) Isquemia mesentérica anterior, posterior y colitis nerviosa.

Son los tipos de isquemia mesentérica aguda, excepto.

- a) Arterial.
- b) Venoso.
- c) Opresivo.
- d) No oclusivo.

Según el origen venoso o trombosis venosa mesentérica, ¿Cómo se clasifica?

- a) Agudo, profundo y anterior.
- b) Agudo, subagudo, crónico.
- c) Agudo, anterior, posterior.
- d) Agudo, no opresivo, crónico.

Manifestaciones clínicas de la isquemia mesentérica aguda, excepto.

- a) Dolor abdominal.
- b) Náuseas, vómito, diarrea.
- c) Dolor de cabeza intenso.
- d) Fiebre.

Gold standard para diagnóstico de isquemia mesentérica aguda.

- a) Radiografía de abdomen.
- b) Tomografía computarizada.
- c) Resonancia magnética.
- d) Angiografía.

Etiología principal de la isquemia mesentérica crónica.

- a) Aterosclerosis de vasos mesentéricos.
- b) Isquemia mesentérica no oclusiva.
- c) Trombosis arterial.
- d) Embolia arterial.

Triada característica de la isquémica mesentérica crónica.

- a) Ictericia, dolor abdominal y fiebre.
- b) Estasis venosa, hipercuagulabilidad y daño endotelial.
- c) Hipotensión arterial, ingurgitación yugular y ruidos cardiacos apagados.
- d) Dolor crónico postprandial, sitofobia, pérdida de peso.

Menciona el tratamiento para la isquemia mesentérica crónica.

**Cirugía de revascularización.**

Etiología más frecuente de la colitis isquémica.

**Bajo flujo como un choque, insuficiencia cardiaca, deshidratación.**

Menciona las manifestaciones clínicas de la colitis isquémica.

**Dolor abdominal, urgencia defecatoria, hematoquecia y signos de peritonitis.**