

Cuestionario apendicitis aguda

1. ¿Cuál es el síntoma más común de la apendicitis aguda?

(a) Dolor abdominal

(b) Náusea y vómito

(c) Fiebre

(d) Diarrea

2. ¿Cuál es la localización típica del dolor abdominal en la apendicitis aguda?

(a) Periumbilical

(b) Cuadrante inferior derecho

(c) Cuadrante superior izquierdo

(d) Epigastrio

3. ¿Cuál es el signo físico más específico de la apendicitis aguda?

(a) Defensa muscular

(b) Dolor a la palpación

(c) Blumberg sign

(d) Rovsing sign

4. ¿Cuál es el tratamiento de elección para la apendicitis aguda?

(a) Antibióticos

(b) Cirugía

(c) Reposo en cama

(d) Dieta líquida

5. ¿Cuál es la complicación más temida de la apendicitis aguda?

(a) Peritonitis

(b) Absceso apendicular

(c) Ruptura apendicular

(d) Inflamación del intestino delgado

6. ¿Cuál es el grupo de edad más afectado por la apendicitis aguda?

(a) Niños

(b) Adolescentes

(c) Adultos jóvenes

(d) Adultos mayores

7. ¿Cuál es la causa más probable de la apendicitis aguda?

(a) Obstrucción del apéndice

(b) Infección del apéndice

(c) Ruptura del apéndice

(d) Inflamación del colon

8. ¿Cuál es el hallazgo radiológico más común en la apendicitis aguda?

(a) Dilatación del colon ascendente

- (b) Obstrucción intestinal
- (c) Masa abdominal en el cuadrante inferior derecho

(d) Inflamación del apéndice

9. ¿Cuál es el marcador bioquímico más sensible para la apendicitis aguda?

(a) Leucocitosis

(b) Neutropenia

(c) Bandemia

(d) PCR

10. ¿Cuál es el diagnóstico diferencial más importante de la apendicitis aguda?

(a) Gastroenteritis

(b) Cólico renal

(c) Diverticulitis

(d) Infección de vejiga

11. ¿Cuál de los siguientes criterios de Alvarado tiene el mayor peso?

(a) Dolor abdominal en el cuadrante inferior derecho

(b) Temperatura ≥ 38 °C

(c) Leucocitosis $\geq 10.000/\mu\text{L}$

(d) Leucocitosis con neutrofilia

12. ¿Cuál es el puntaje mínimo para diagnosticar apendicitis aguda con los criterios de Alvarado?

(a) 5

(b) 7

(c) 9

(d) 10

13. ¿Cuál de los siguientes hallazgos es un criterio de exclusión para los criterios de Alvarado?

(a) Dolor en el cuadrante inferior izquierdo

(b) Vómitos

(c) Diarrea

(d) Fiebre ≥ 39 °C

Cuestionario obstrucción intestinal

1. ¿Qué porción del intestino es más comúnmente afectada por la obstrucción intestinal en adultos?

A) Duodeno

B) Yeyuno

C) Íleon

D) Colon

2. ¿Cuál de los siguientes NO es un síntoma principal de la obstrucción intestinal?

A) Dolor abdominal

B) Náuseas y vómitos

C) Pérdida de peso rápida

D) Distensión abdominal

3. En la obstrucción intestinal, ¿qué tipo de dolor se asocia típicamente con la afectación del intestino delgado?

A) Dolor epigástrico

B) Dolor tipo cólico en la parte central del abdomen

C) Dolor en el hipocondrio izquierdo

D) Dolor difuso y leve

4. ¿Cuál de las siguientes es una causa común de obstrucción intestinal mecánica en adultos?
- A) Íleo adinámico
 - B) Cáncer de colon**
 - C) Enfermedad inflamatoria intestinal
 - D) Apendicitis
5. ¿Cuál es una característica del íleo adinámico en comparación con la obstrucción intestinal mecánica?
- A) Afecta únicamente al colon
 - B) Es una obstrucción sin causa mecánica**
 - C) Presenta vómitos severos
 - D) Es causado comúnmente por tumores
6. ¿Qué hallazgo radiográfico es característico del vólvulo sigmoideo?
- A) Niveles hidroaéreos
 - B) Dilatación generalizada del colon
 - C) Signo del "grano de café"**
 - D) Aire libre en la cavidad peritoneal
7. ¿Cuál de los siguientes es un signo de alarma en la obstrucción intestinal?
- A) Dolor leve y ocasional
 - B) Incremento en el peristaltismo
 - C) Fiebre y leucocitosis**
 - D) Diarrea persistente
8. ¿Qué estructura anatómica contiene las arterias marginales necesarias para evaluar la viabilidad del intestino?
- A) Yeyuno
 - B) Mesenterio**
 - C) Esfínter anal interno
 - D) Duodeno
9. ¿Cuál de los siguientes métodos de diagnóstico es el más adecuado para evaluar la etiología de la obstrucción intestinal?
- A) Ultrasonido
 - B) Tomografía computarizada (TC)**
 - C) Radiografía de tórax
 - D) Endoscopia digestiva alta
10. ¿Cuál es el tratamiento inicial para una obstrucción intestinal sin signos de complicación?
- A) Cirugía inmediata
 - B) Reposición de líquidos y descompresión nasogástrica**

- C) Uso de antibióticos
- D) Ayuno absoluto sin tratamiento adicional

11. ¿Qué tipo de obstrucción intestinal puede ser adecuada para cirugía laparoscópica en fases tempranas?

- A) Íleo adinámico
- B) Obstrucción del intestino proximal
- C) Obstrucción intestinal distal
- D) Obstrucción sin complicaciones

12. ¿Cuál es la función principal del esfínter anal interno en el sistema digestivo?

- A) Controlar la defecación voluntaria
- B) Facilitar el paso de las heces hacia el colon
- C) Regular el paso de contenido hacia el intestino grueso
- D) Mantener el tono anal involuntariamente

13. ¿Qué hallazgo radiográfico indica obstrucción en una radiografía simple de abdomen?

- A) Aire libre en el diafragma
- B) Presencia de niveles hidroaéreos
- C) Engrosamiento del colon sigmoideo
- D) Ausencia de aire en el colon

14. ¿Cuál de los siguientes no es una causa común de íleo?

- A) Intervenciones quirúrgicas recientes
- B) Infecciones peritoneales
- C) Cálculos biliares
- D) Trastornos electrolíticos

15. ¿Qué tipo de obstrucción intestinal se asocia con el signo del “grano de café”?

- A) Vólvulo sigmoideo
- B) Íleo adinámico
- C) Hernia incarcerada
- D) Intususcepción

16. En caso de obstrucción intestinal complicada, ¿qué procedimiento suele realizarse?

- A) Observación
- B) Tratamiento conservador
- C) Cirugía de urgencia
- D) Administración de analgésicos

17. ¿Cuál es la función principal del intestino grueso en el proceso digestivo?

- A) Digestión de proteínas
- B) Absorción de nutrientes

C) Absorción de agua y electrolitos

D) Producción de ácido clorhídrico

18. ¿En qué situación es común que aparezcan vómitos biliares?

A) Obstrucción del intestino distal

B) Obstrucción del intestino proximal

C) Íleo adinámico

D) Obstrucción en el colon sigmoideo

19. ¿Qué característica indica que un segmento del intestino no es viable?

A) Color normal del intestino

B) Ausencia de peristalsis

C) Pulsaciones arteriales presentes

D) Buen flujo sanguíneo

20. ¿Cuál es el pronóstico general para los pacientes con obstrucción intestinal sin complicaciones?

A) Pobre

B) Desfavorable

C) Favorable con tratamiento adecuado

D) Grave en todos los casos

21. ¿Cuál es una causa común de obstrucción intestinal en pacientes pediátricos?

A) Cáncer de colon

B) Íleo biliar

C) Invaginación intestinal

D) Diverticulitis

22. ¿Cuál de las siguientes es una complicación posible de la obstrucción intestinal?

A) Úlcera péptica

B) Necrosis intestinal

C) Hemorragia digestiva alta

D) Colelitiasis

23. En el cuadro clínico de la obstrucción intestinal, ¿cuál de los siguientes signos es más indicativo de una obstrucción alta?

A) Vómitos fecaloides

B) Distensión abdominal severa

C) Vómitos biliares tempranos

D) Fiebre persistente

24. ¿Qué tipo de obstrucción intestinal se caracteriza por la falta de movimiento o peristalsis en el intestino?

A) Íleo adinámico

- B) Vólvulo
- C) Hernia estrangulada
- D) Obstrucción por tumores

25. ¿Cuál de las siguientes afirmaciones es correcta respecto a la obstrucción intestinal mecánica?

- A) Siempre requiere tratamiento quirúrgico inmediato
- B) Se debe principalmente a una interrupción del suministro nervioso
- C) Puede ser completa o parcial
- D) Solo afecta al intestino grueso

26. En el diagnóstico de la obstrucción intestinal, ¿qué imagen radiográfica puede sugerir complicación por vólvulo?

- A) Signo de "pico de ave"
- B) Niveles hidroaéreos en todo el abdomen
- C) Dilatación del intestino delgado con aire distal
- D) Engrosamiento de las paredes intestinales

27. ¿Cuál de las siguientes opciones NO es un criterio para considerar la viabilidad de un segmento intestinal durante una cirugía de obstrucción?

- A) Presencia de pulsaciones arteriales marginales
- B) Peristalsis adecuada
- C) Color oscuro y negruzco
- D) Color normal del tejido

28. ¿Cuál de las siguientes es una indicación común para la cirugía en la obstrucción intestinal?

- A) Obstrucción parcial sin signos de alarma
- B) Dolor abdominal leve y controlable
- C) Evidencia de necrosis intestinal
- D) Distensión leve y ausencia de fiebre

29. En una obstrucción intestinal baja, ¿cuál de los siguientes síntomas es menos probable?

- A) Distensión abdominal marcada
- B) Vómitos precoces
- C) Vómitos fecaloides
- D) Retención de gases y heces

30. ¿Qué tipo de obstrucción intestinal es más probable que cause una perforación en el intestino?

- A) Obstrucción por bridas o adherencias
- B) Íleo adinámico
- C) Obstrucción por cuerpo extraño

D) Obstrucción en el colon sigmoideo