


UDS
Mi Universidad

NOMBRE DE LA ALUMNA: JOHANA
ALEJANDRA MUÑOZ LAY

NOMBRE DEL DOCENTE: DRA. IRMA
SANCHEZ PRIETO

MATERIA: PSIQUIATRIA

MEDICINA HUMANA



ACTIVIDAD: CRITICAS

09 DE NOVIEMBRE DEL 2024

Crítica de psicosis

Los trastornos psicóticos afectan al 1% de la población a nivel mundial con una edad de inicio en un promedio de 20 años. La psicosis se caracteriza principalmente por tener episodios de alucinaciones y delirios.

Esta conformado por etapas clínicas: etapa premórbida, etapa prodrómica, etapa de primera episodio, etapa de recaída y etapa crónica

En la etapa premorvida, lo podemos asociar, principalmente a factores sociales en los que un individuo puede estar sometido para poder desarrollar un trastorno psicótico, entre los factores sociales podemos relacionarlo con el ámbito familiar, ya sea por una sensación de soledad y aislamiento o también pérdida del sentido común, e inclusive por pérdidas familiares.

En la etapa prodrómica, se caracteriza principalmente por la sensación de que algo importante pueda suceder, sin embargo, eso ya va dentro de síntomas antes de que ocurra algún episodio de psicosis. También pueden sentir la sensación de ser la mayor prominencia en el mundo que incluso pueden llegar a sentirse INALCANZABLES.

La etapa del primer episodio, en donde se observa una sensación de alivio a causa de la aparición de los de grillos, en la cual el individuo entra en un estado de "transe" dónde no presentan ningún síntoma negativo

En la etapa de recaída, suele ser la más perjudicante para un individuo, ya que al pasar los efectos de la psicosis puede presentar sensaciones de duelo por pérdidas personales, e inclusive el sentimiento de división entre las realidades. La etapa crónica, voy enfocado hacia la aceptación del nuevo mundo en el que se encuentra el individuo y aceptar la realidad de lo que realmente está viviendo

Es por eso que a los pacientes con psicosis se les debe de dar tratamientos y cuidados específicos. la atención hospitalaria se le debe de dar en experiencia a un suceso traumático o respiro. En los servicios preventivos o de intervención temprana, se debe promover y restaurar la esperanza del individuo. en la atención ambulatoria, debemos valorar a cada persona de cualquier lugar o circunstancia en la que se encuentre.

También es muy importante el tratamiento psicológico, ya que este va a ayudar a combatir pensamientos negativos y comprender las experiencias que están pasando actualmente. Otro método como última alternativa el uso de medicamentos. la experiencia que vive una persona con trastorno

Afecta de manera personal e idiosincrásica, es esencial, escuchar y comprender la realidad humana y experiencia de los pacientes, por lo cual el artículo busca mejorar la comprensión de la psicosis y beneficia a áreas como la atención médica, educación y la investigación

Crítica de Trastorno bipolar

Se caracteriza por episodios alternos de depresión y manía o hipomanía conocidos también como tipo de (bipolar I) y (bipolar II). Estos episodios se determinan por periodos de estado de ánimo moderadamente exaltado o irritable, a lo que conlleva aumento de la energía y una mayor actividad que representa un cambio notable del comportamiento anterior.

El inicio del trastorno bipolar suele ocurrir durante la adolescencia o la edad adulta temprana. El reconocimiento temprano y el tratamiento óptimo del trastorno bipolar son importantes porque la respuesta al tratamiento es mayor en las primeras etapas.

La manía (bipolar I) se caracteriza por un estado de ánimo elevado, expansivo o irritable que dura al menos una semana, con consecuencias importantes que suelen requerir la hospitalización. Los síntomas de la manía incluyen exaltación del estado de ánimo, grandiosidad, impulsividad, conductas de riesgo, inquietud, pensamientos acelerados, reducción de la necesidad de dormir, aumento de la productividad, exceso de confianza en uno mismo, deterioro del juicio, irritabilidad y agitación.

La hipomanía que se define como el tipo de (bipolar II), es una forma más leve de manía que debe cumplir con al menos cuatro días consecutivos de episodios de estado de ánimo elevado o irritable y aumento de energía y comportamiento dirigido a objetivos, los episodios hipomaniacos o moniacos son la característica determinante del trastorno bipolar, los pacientes suelen buscar tratamiento durante cada episodio de depresión, la depresión suele ser la presentación inicial de cada paciente, por lo que los síntomas depresivos son similares a los de la depresión bipolar y el trastorno depresivo mayor. Hay diagnósticos, diferenciales y características que nos puedan ayudar a definir el contexto en el que se encuentra en trastorno bipolar. Para poder diferenciar al paciente que tiene, es necesario preguntar a familiares sobre algún episodio que se haya presentado en el cual el paciente se halla exaltado o deprimido. Esos episodios inclusive pueden estar en relación algún proceso traumático que haya bebido en la infancia o algún hecho familiar que lo haya afectado de forma muy específica. Cuando una persona sufre de trastorno bipolar es común, cuestionarse ¿cuáles son las opciones del tratamiento de primera línea para el trastorno bipolar?, cómo puedo distinguir los tipos de trastorno bipolar?, ¿Cómo puedo diagnosticar sin confundir al trastorno bipolar?. el tratamiento de primera línea que se proporciona son antipsicóticos, aunque también dependen del tipo de trastorno que tenga. Para distinguirlo, es necesario la valoración de las características clínicas este presente.

Actualmente los pacientes con trastorno bipolar, tienen una frecuencia y duración en sus emociones, es decir, en los cambios de humor. Éste trastorno tiene un alto rango de suicidio, donde afecta principalmente el sexo masculino que acaban de pasar por procesos dolosos como un desempleo un divorcio una pérdida. Otro aspecto importante valorar son los riesgos cardiovasculares que el individuo pueda llegar a presentar, por lo cual es necesario prevenirlos.

El tratamiento farmacológico es una base para adaptarse a la clínica del individuo. Este tiene el objetivo de reducir la mayor cantidad de episodios que este presente. El medicamento busca mejorar el estado de ánimo..

también se recomienda la terapia combinada donde se utiliza estabilizador del estado de ánimo y antipsicóticos. Los antidepresivos son opciones complementarias para estos pacientes que tienen cierta resistencia al tratamiento.