



UNIVERSIDAD DEL SURESTE

Licenciatura

Medicina Humana

Materia

Medicina forense.

Docente

Dra. Irma Sánchez Prieto.

Trabajo

Asfixiología.

Estudiante

Kevin Jahir Kraul Borrallés

Grado y grupo

5 semestre

Grupo "A"

Parcial 2

Tapachula, Chiapas

11 de octubre de 2024

Equimosis en sus diferentes variables

Excoriación

Herida cortante

Herida contuso-cortante

Hematoma



Se observa una equimosis en el ojo derecho. La lesión presenta un color violáceo, con tonalidades que varían a azuladas y amarillentas en los bordes. Tiene una forma irregular de una medida de 10x8cm. La equimosis se extiende desde el párpado superior hasta el párpado inferior, afectando también la región periorbital.



Se observa una equimosis en el tercio proximal de la región anterior del muslo derecho. La lesión presenta zonas de color negro a violáceo en su centro, de una medida de 7x9 cm.



Presenta una excoriación de forma circular con una coloración rojiza en su centro con tejido hemático, de una medida de 10x9 cm, ubicada en tercio medial de la región anterior del muslo derecho, 4 laceraciones lineales de 15cm la mas larga y 11 la mas pequeña. En el muslo izquierdo presenta una excoriación de forma irregular de color rojiza, que comprende una medida de 11x6cm en el tercio medial del muslo izquierdo.



Presenta una herida lineal por instrumento cortante con bordes definidos con tejido hemático de 5cm de largo en la región anterior del tercio distal del antebrazo.



se observa una herida contuso-cortante, con 2 heridas de colgajo. De bordes asimétricos, con tejido hemático, en la parte dorsal de la mano izquierda con una medida de 6x6 cm



Se observa un hematoma de forma circular con una coloración violácea de un tamaño de 3x4cm en la región anterior del tercio medial del brazo derecho.