

Mi Universidad

Infografía

Nombre del alumno: Hannia González Macías

Nombre del tema: Miastenia gravis


Grado: 5to semestre Grupo: "A"

Nombre de la materia: Medicina terapia y de rehabilitación

Nombre del profesor: Dra. Karen Michelle Bolaños Pérez

Licenciatura: Medicina Humana

Tapachula, Chiapas. 14 de septiembre del 2024.



MIASTENIA GRAVIS

Enfermedad neuromuscular autoinmune causada por anticuerpos que se dirigen contra la membrana muscular postsináptica.

SIGNOS Y SÍNTOMAS MÁS FRECUENTES

- Síntomas oculares de ptosis y/o diplopía.
- Síntomas bulbares como disartria, disfagia y fatiga a la masticación.
- Debilidad proximal de extremidades.

PRUEBA DE LA BOLSA DE HIELO (ICE PACK TEST)



EPIDEMIOLOGÍA

10 y 30 casos por millón (incidencia).
Mujeres <40 años, hombres (>50 años)

Es la debilidad muscular fluctuante, que empeora con el ejercicio.

ANTICUERPOS ANTI-MUSK (TIROSIN-CINASA MUSCULAR ESPECÍFICA)

PRUEBAS ELECTROFISIOLÓGICAS

PRUEBA DE ESTIMULACIÓN NERVIOSA REPETITIVA (PENR)

ELECTROMIOGRAFÍA DE FIBRA SIMPLE O ÚNICA

DIAGNÓSTICO

En los pacientes con diagnóstico clínico de Miastenia Gravis, se debe confirmar el diagnóstico por medio de pruebas inmunológicas y/o pruebas electrofisiológicas.




DIAGNÓSTICO DIFERENCIAL: SÍNDROME DE LAMBERT-EAON

TIMOMA=TIMECTOMÍA

TRATAMIENTO

- **La azatioprina (AZA)** es un análogo de purina, que interfiere con la síntesis de ADN e interrumpe la proliferación de los linfocitos B y T.
- Timectomía



Bibliografía

- Diagnóstico y Tratamiento de Miastenia Gravis. Guía de Práctica Clínica: Evidencias y Recomendaciones. México, CENETEC; 2020 [11 de septiembre del 2024].
- Disponible en: <http://www.cenetec-difusion.com/CMGPC/GPC-institucion-num-año/ER.pdf>