



**Mi Universidad**

**ALUMNO:**

**UZIEL DOMINGUEZ ALVAREZ**

**DOCENTE:**

**DRA. ANEL GUADALUPE GORDILLO ABADILLA**

**MATERIA:**

**MEDICINA DEL TRABAJO**

**ACTIVIDAD:**

**HISTORIA DE LA ENFERMEDAD LEAVELL Y CLARK**

**CARRERA:**

**MEDICINA HUMANA**

**UNIVERSIDAD:**

**UNIVERSIDAD DEL SURESTE**

**LUGAR Y FECHA:**

**TAPACHULA CHIAPAS A 03/10/2024**

# HISTORIA DE LA ENFERMEDAD LEAVELL Y CLARK "Tuberculosis"

## AMBIENTE

Se contagia por tener contacto con las gotitas de saliva de una persona con tuberculosis en relación al contacto dentro de su área laboral.



La tuberculosis puede afectar a personas de cualquier edad y sexo las personas de mayor riesgo son aquellas cuyos sistemas inmunológicos estén debilitados

La tuberculosis es una enfermedad infecto-contagiosa que afecta mayoritariamente al sistema respiratorio por MYCOBACTERIUM TUBERCULOSIS

HUESPED

AGENTE



## CLINICO:

Generalmente se presenta en forma de TBC pulmonar con síntomas inespecíficos como:

1. Anorexia
2. Astenia
3. Diaforesis
4. Tos
5. Febrícula
6. Hemoptisis
7. Tos intensa que dura 3 semanas
8. Dolor en el pecho.

## SUBCLINICO:

Suele afectar los pulmones también puede verse afectada otras partes del cuerpo por ejemplo los ganglios linfáticos, los riñones, los huesos, las articulaciones.

El síntoma más frecuente es la tos.

## PREVENCION PRIMARIA

1. Evitar infección del bacilo en población expuesta sin infección:
2. Uso de mascarilla durante el periodo de contagio
3. Etiquetas de tos (cubrir boca y nariz durante al toser)
4. Implementar medidas de control de infecciones
5. Promoción de la ventilación natural en la vivienda del trabajo, centro educativo, transporte público y entre otras instituciones.
6. Vacuna BCG, control de infecciones (bioseguridad)

## PREVENCION SECUNDARIA

1. Diagnostico precoz: estudio de contactos
2. Índices: TB extrapulmonar, TB sensible, TB persistente
3. Censo: En primera entrevista de enfermería
4. Control: Examen a lo largo del tratamiento
5. TB sensible: 3 veces al inicio cambio de fase y al final.
6. TB resistente: al inicio y cada 3 meses
7. Registrar actividades en la sección control de contactos de la tarjeta de control de tratamientos con medicamento de 1ra y 2da línea.

## PREVENCION TERCIARIA

1. Rehabilitación respiratoria
2. Rehabilitación laboral (reinserción laboral)
3. Adherencias
4. Tratamiento eficaz y oportuno.

## REFERENCIAS:

- <https://www.mayoclinic.org/es/diseases-conditions/tuberculosis/symptoms-causes/syc-20351250>
- <https://medlineplus.gov/spanish/ency/article/000077.htm>