

HIPOACUSIA

SECUELAS

Sordera

COMPLICACIONES

Mareos y vértigos

SIGNOS Y SINTOMAS

Acufenos, mareos, aislamiento, depresión, tinitus.

CAMBIOS TISULARES

Hipoacusia, lesión en la que se impide la conducción del sonido con normalidad al oído interno

Neurosensorial: causada por lesiones del oído interno o del nervio VIII

Mixta: puede ser causado por traumatismo craneoencefálico en la que puede o no estar fracturado el hueso temporal

AGENTE



AMBUENTE

HUESPED

AGENTE: Ruidos, cambios de presión y temperatura, metales pesados, y traumatismos

HUESPED: Toda persona en general

AMBUENTE: La exposición al trabajo

PREVENCION PRIMARIA

PROMOCION

Platicas de higiene personal

Platicas de buena alimentación

PROTECCION

Realizar estudios de laboratorio

PREVENCION SECUNDARIA

DX PRECOZ

Anamnesis

Exploración física

Pruebas audiológicas

Audiometría

TRATAMIENTO ESPECIFICO

Lavado Ótico

Audioprótesis

Implantes cocleares

LIMITACION DEL DAÑO

Exámenes físicos regulares, uso de protectores de odios y orejas, limitar la duración e intensidad de la exposición al

PREVENCION TERCARIA

REHABILITACION

Psicología, para la aceptación del padecimiento

Apoyo a la reincorporación social

Aceptación de su nuevo aspecto